

TENT COOPERATION TRE. Y

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

United States Patent and Trademark
Office
(Box PCT)
Crystal Plaza 2
Washington, DC 20231
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 05 July 1999 (05.07.99)	
International application No. PCT/EP98/07876	Applicant's or agent's file reference 17791P WO
International filing date (day/month/year) 03 December 1998 (03.12.98)	Priority date (day/month/year) 03 December 1997 (03.12.97)
Applicant BURG, Josef et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:18 May 1999 (18.05.99)☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:2. The election ☒ was☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

<p>The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland</p> <p>Facsimile No.: (41-22) 740.14.35</p>	<p>Authorized officer</p> <p>F. Baechler</p> <p>Telephone No.: (41-22) 338.83.38</p>
--	--

TENT COOPERATION TRE.

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

WEICKMANN, H.
Kopernikusstrasse 9
D-81679 München
ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year) 02 July 1999 (02.07.99)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference 17791P WO	
International application No. PCT/EP98/07876	International filing date (day/month/year) 03 December 1998 (03.12.98)

1. The following indications appeared on record concerning:		
<input checked="" type="checkbox"/> the applicant	<input type="checkbox"/> the inventor	<input type="checkbox"/> the agent <input type="checkbox"/> the common representative
Name and Address ROCHE DIAGNOSTICS GMBH Sandhofer Strasse 122-132 D-68305 Mannheim Germany	State of Nationality DE	State of Residence DE
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:		
<input type="checkbox"/> the person	<input type="checkbox"/> the name	<input checked="" type="checkbox"/> the address <input type="checkbox"/> the nationality <input type="checkbox"/> the residence
Name and Address ROCHE DIAGNOSTICS GMBH Sandhofer Strasse 112-132 D-68305 Mannheim Germany	State of Nationality DE	State of Residence DE
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
3. Further observations, if necessary:		
4. A copy of this notification has been sent to:		
<input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office	<input checked="" type="checkbox"/> the designated Offices concerned	
<input type="checkbox"/> the International Searching Authority	<input type="checkbox"/> the elected Offices concerned	
<input type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority	<input type="checkbox"/> other:	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Céline Faust
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

5630

09/555950

Applicant's or agent's file reference 17791P WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP98/07876	International filing date (day/month/year) 03 December 1998 (03.12.98)	Priority date (day/month/year) 03 December 1997 (03.12.97)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C07K 14/505, C12N 15/16, 15/85, 5/06, 5/08, 5/10, A61K 38/18		
Applicant ROCHE DIAGNOSTICS GMBH		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.	
2. This REPORT consists of a total of <u>7</u> sheets, including this cover sheet.	
<input checked="" type="checkbox"/>	This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).
These annexes consist of a total of <u>9</u> sheets.	
3. This report contains indications relating to the following items:	
I <input checked="" type="checkbox"/>	Basis of the report
II <input type="checkbox"/>	Priority
III <input type="checkbox"/>	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
IV <input type="checkbox"/>	Lack of unity of invention
V <input checked="" type="checkbox"/>	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
VI <input type="checkbox"/>	Certain documents cited
VII <input type="checkbox"/>	Certain defects in the international application
VIII <input checked="" type="checkbox"/>	Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 18 May 1999 (18.05.99)	Date of completion of this report 14 March 2000 (14.03.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP98/07876

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-52, as originally filed,
pages _____, filed with the demand,
pages _____, filed with the letter of _____,
pages _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the claims, Nos. _____, as originally filed,
Nos. _____, as amended under Article 19,
Nos. _____, filed with the demand,
Nos. 1-38, filed with the letter of 10 February 2000 (10.02.2000),
Nos. _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the drawings, sheets/fig 1/3-3/3, as originally filed,
sheets/fig _____, filed with the demand,
sheets/fig _____, filed with the letter of _____,
sheets/fig _____, filed with the letter of _____.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 98/07876

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	22-32	YES
	Claims	1-21, 33-38	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	22-32	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-38	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1. Attention is drawn to the following documents:

- D1: TAKEUCHI M ET AL, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, Vol. 86, 1989, pages 7819 to 7822;
- D3: WO-A-95/12684 (AMGEN INC) May 11, 1995;
- D6: WATSON E ET AL, GLYCOBIOLOGY, Vol. 4, No. 2, 1994, pages 227 to 237;
- D7: NIMTZ M ET AL, EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, Vol. 213, No. 1, 1993, pages 39 to 56;
- D8: HOKKE C H ET AL, EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, Vol. 228, March 1995, pages 981 to 1008;
- D11: WO-A-96/35718 (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH; BURG JOSEF (DE); SCHNEIDER WALTER (DE)), November 14, 1996;
- D12: EP-A-0 267 678 (INTEGRATED GENETICS, INC.) May 18, 1998

2. The present application does not satisfy the criterion of PCT Article 33(2) because the subject matter of Claims 1 to 21 and 33 to 38 is not novel.

D6 states that recombinant EPO from CHO cells contains 82% tetraantennary oligosaccharides which are 95% sialylated. The tetraantennary oligosaccharides contain between 4 and 7 (i.e. an average of 5.5) N-acetyl lactosamine units, based on a N-bound carbohydrate chain (cf. Table II). (The known EPO composition is therefore prejudicial to the novelty of all the independent product claims, that is to say, Claims 1, 2, 4 and 5.) (However, dependent Claims 3 and 6 to 19, and Claim 20, do not define any features which distinguish the claimed compositions from those in the prior art either.)

Other prior art documents cited in the search report also disclose the claimed subjects. Document D7, for example, states that recombinant EPO from BHK cells contains over 82% tetraantennary structures. Tetraantennary structures contain at least 4 N-acetyl lactosamine units, based on a N-bound carbohydrate chain. Normally, this figure is higher, however, as a result of the presence of additional repeats (which may lead to a figure of up to 7 N-acetyl lactosamine units); in the D7 preparation, the figure is approximately 4.3, based on the 82% tetraantennary structures. The standard EPO composition described in D1 also contains 80% tetraantennary oligosaccharides.

With regard to independent Claims 4 and 5, it should also be noted that, where a tetraantennary structure undergoes virtually complete sialylation (as described in the prior art), the product of the number of N-acetyl lactosamine units, based on a N-bound carbohydrate chain, and the sialic acid



content per molecule is at least 48 (4LU X 12SA). This figure is, furthermore, even higher in the known EPO compositions as a result of additional N-acetyl lactosamine unit repeats.


It should be noted that even the discovery of novel features of a known product (in this case an EPO composition) cannot render this product novel. Only products whose features are clearly different from those of the prior art may be considered novel.

Claims 21 and 33 to 38 lack novelty over the known methods for preparing recombinant EPO.

For example, D1 discloses that activity is increased by the accumulation of EPO molecules with an elevated percentage of tetraantennary structures, which automatically means an elevated percentage of N-acetyl lactosamine units. D8 discloses that a high degree of sialylation leads to a high level of activity (cf. page 1004, right-hand column, lines 6 to 14). Furthermore, the product of the number of N-acetyl lactosamine units and the sialic acid content is automatically higher with an elevated sialic acid content, even if the number of N-acetyl lactosamine units remains constant.

3. Dependent method Claims 22 to 32 appear to be novel over the searched prior art. They do not, however, appear to involve an inventive step.

Claims 22 to 28 relate to the selection of specific culturing conditions, such as the type of nutrients to be added (Claims 22, 23 and 27), the continuous addition of these nutrients (Claims 24 to 26), and



the culturing temperature (Claim 28). These conditions are, however, just possibilities from which a person skilled in the art would choose according to the circumstances without being inventive. They could only involve an inventive step if a surprising effect over the prior art could be demonstrated. The fact that the culturing conditions, e.g. temperature or CO₂ level, affect the glycosylation of EPO was already known from the prior art (cf. document D3, particularly pages 4 to 5). The continuous production of EPO in serum-free medium was also known (cf. D12, particularly the bottom of page 5).

Claims 29 to 32 relate to the accumulation of EPO by chromatography. This is, however, well known from the prior art; cf. document D11, for example, which discloses reversed phase-HPLC with elution by acetonitrile (cf. page 9, second paragraph) and chromatography on a triazine dye (cf. page 7, fifth paragraph). It is also general common knowledge in the art that glycoproteins can be accumulated on lectins by affinity chromatography (Claim 35).

It should also be noted that the subjects claimed are not limited to the increase in the proportion of N-acetyl lactosamine units independently of other parameters such as antennarity. Furthermore, the application does not actually show that the proportion of N-acetyl lactosamine units has a positive effect on activity even with the same percentage of tetraantennary structures.


VIII Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

1. Although Claims 1, 2, 4 and 5 have been drafted as separate, independent claims, they actually appear to relate to one and the same subject and apparently differ from one another only in that they give mutually divergent definitions of the subject matter for which protection is sought. The claims are not therefore concise. The claims as a whole also lack clarity since, owing to the large number of independent claims, it is difficult, if not impossible, to establish the subject matter for which protection is sought. This in turn makes it unreasonably hard for third parties to establish the scope of protection. It is also unclear how far the subjects of Claims 1 and 4 differ from those of Claims 2 and 5 respectively.

These claims do not therefore satisfy the requirements of PCT Article 6.

2. Claim 24 is unclear as a result of the term "in particular", which has no limiting effect. The claim therefore also relates to methods which do not lead to one of the EPO compositions defined in the application.
3. Contrary to PCT Rule 5.1(a)(iii), the description has not been brought into line with the claims.



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 17 MAR 2000

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 17791P WO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/07876	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 03/12/1998	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 03/12/1997
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C07K14/505		
Anmelder ROCHE DIAGNOSTICS GMBH et al		



- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationale vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 7 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.


☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt 9 Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit und der gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 18/05/1999	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 14. 03. 00
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Giebeler, K Tel. Nr. +49 89 2399 8546 



I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

Beschreibung, Seiten:

1-52 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-38 eingegangen am 10/02/2000 mit Schreiben vom 10/02/2000

Zeichnungen, Blätter:

1/3-3/3 ursprüngliche Fassung

2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
☐ Ansprüche, Nr.:
☐ Zeichnungen, Blatt:

3. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)):

4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	22-32
	Nein: Ansprüche	1-21,33-38
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	22-32
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-38
	Nein: Ansprüche	


2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt



Zu Punkt V

**Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und
Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: TAKEUCHI M ET AL, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF
SCIENCES OF USA, Bd. 86, 1989, Seiten 7819-7822
D3: WO 95 12684 A (AMGEN INC) 11. Mai 1995
D6: WATSON E ET AL, GLYCOBIOLOGY, Bd. 4, Nr. 2, 1994, Seiten 227-237
D7: NIMTZ M ET AL, EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, Bd. 213, Nr.
1, 1993, Seiten 39-56,
D8: HOKKE C H ET AL, EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, Bd. 228,
März 1995, Seiten 981-1008,
D11: WO 96 35718 A (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH; BURG JOSEF (DE);
SCHNEIDER WALTER (DE);) 14. November 1996
D12: EP-A-0 267 678 (INTEGRATED GENETICS, INC.) 18. Mai 1988

2. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht das in Artikel 33(2) PCT genannte
Kriterium, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-21 und 33-38 nicht neu ist.

In D6 wird beschrieben, daß rekombinantes EPO aus CHO-Zellen 82%
tetraantennäre Oligosaccharide enthält, welche zu 95% vollständig sialyliert sind.
Die tetraantennäre Oligosaccharide enthalten zwischen 4 und 7 (d.h.
durchschnittlich 5,5) N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf eine N-
gebundene Kohlenhydratkette (siehe Tab. II). Die bekannte EPO-
Zusammensetzung ist somit neuheitsschädlich für alle unabhängigen
Produktansprüche, d.h. die Ansprüche 1, 2, 4 und 5. Jedoch nennen auch die
abhängigen Ansprüche 3 und 6-19 sowie Anspruch 20 keine Merkmale, welche
die beanspruchten Zusammensetzungen von denen aus dem Stand der Technik
unterscheiden.



Auch andere der im Recherchenbericht zitierten Dokumente aus dem Stand der Technik offenbaren die beanspruchten Gegenstände. Das Dokument D7 beispielsweise beschreibt, daß rekombinantes EPO aus BHK-Zellen einen Anteil von über 82% an tetraantennären Strukturen enthält. Tetraantennäre Strukturen enthalten mindestens 4 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf eine N-gebundene Kohlenhydratkette. Normalerweise liegt dieser Wert jedoch durch die Anwesenheit zusätzlicher "repeats" (welche zu einem Wert von bis zu 7 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten führen können) höher; bei der Präparation aus D7 liegt er bei etwa 4,3, bezogen auf die 82% tetraantennärer Strukturen. Auch die in D1 beschriebene Standard-EPO-Zusammensetzung enthält einen Anteil an tetraantennären Oligosacchariden von 80%.

In Bezug auf die unabhängigen Ansprüche 4 und 5 ist außerdem zu sagen, daß sich bei nahezu vollständiger Sialylierung (wie im Stand der Technik beschrieben) einer tetraantennären Struktur ein Produkt aus der Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf eine N-gebundene Kohlenhydratkette und dem Sialinsäuregehalt pro Molekül von mindestens 48 (4LE x 12SA) ergibt, wobei dieser Wert bei den bekannten EPO-Zusammensetzungen aufgrund von zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten ("repeats") noch höher liegt.

Es wird darauf hingewiesen, daß selbst das Auffinden neuer Merkmale eines bekannten Produkts (hier: EPO-Zusammensetzung) nicht die Neuheit dieses Produkts herstellen kann. Nur Produkte, deren Merkmale sich eindeutig von denen des Standes der Technik unterscheiden, könnten als neu angesehen werden.

Den Ansprüchen 21 und 33-38 fehlt es gegenüber den bekannten Herstellungsverfahren von rekombinantem EPO an Neuheit.


So war aus D1 bekannt, daß die Anreicherung von EPO-Molekülen mit einem erhöhten Anteil an tetraantennären Strukturen, welche automatisch einen erhöhten Anteil von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten zur Folge hat, zur Erhöhung der Aktivität führt. Aus D8 war bekannt, daß ein hoher Sialylierungsgrad zu einer hohen Aktivität führt (siehe Seite 1004, rechte Spalte, Zeilen 6-14), wobei ja das Produkt aus der Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten und dem Sialinsäuregehalt bei erhöhtem Sialinsäuregehalts selbst bei konstanter Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten automatisch höher ist.

3. Die abhängigen Verfahrensansprüche 22 bis 32 scheinen gegenüber dem bekannt gewordenen Stand der Technik neu zu sein. Jedoch werden sie nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen.

Ansprüche 22-28 beziehen sich auf die Auswahl bestimmter Kultivierungsbedingungen wie z.B. die Art der zugegebenen Nährstoffe (Ansprüche 22, 23, 27), die kontinuierliche Zugabe dieser Nährstoffe (Ansprüche 24-26) sowie die Kultivierungstemperatur (Anspruch 28). Die Auswahl solcher Bedingungen liegt jedoch innerhalb dessen, wozu der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den Umständen entsprechend in der Lage ist, und könnten nur dann eine erfinderische Tätigkeit begründen, wenn gegenüber dem Stand der Technik ein überraschender Effekt nachgewiesen worden wäre. Die Tatsache, daß sich die Kultivierungsbedingungen, wie beispielsweise die Temperatur oder der CO₂ Spiegel, auf die Glykosylierung von EPO auswirken, war bereits aus dem Stand der Technik bekannt, siehe das Dokument D3, insbesondere Seiten 4-5. Ebenso bekannt war die kontinuierliche Produktion von EPO in serumfreiem Medium, siehe D12, insbesondere Seite 5 unten.

Ansprüche 29-32 beziehen sich auf die Anreicherung von EPO mittels Chromatographie. Diese ist jedoch aus dem Stand der Technik gut bekannt, siehe beispielsweise das Dokument D11 welches Reversed-Phase-HPLC mit Elution durch Acetonitril (s. S. 9, Absatz 2) sowie Chromatographie an einem Triazinfarbstoff (s. S. 7, Absatz 5) offenbart. Auch liegt es innerhalb allgemeinen Fachwissens, daß Glykoproteine mittels Affinitätschromatographie an Lectinen angereichert werden können (Anspruch 35).

Außerdem wird darauf hingewiesen, daß die beanspruchten Gegenstände nicht auf die Erhöhung des Anteils von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten unabhängig von anderen Parametern wie Antennarität beschränkt sind. Im übrigen wird durch die Anmeldung nicht tatsächlich gezeigt, daß sich der Anteil von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten auch bei gleichem Anteil tetrantennären Strukturen positiv auf die Aktivität auswirkt.



Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

4. Die Ansprüche 1, 2, 4 und 5 wurden zwar als getrennte, unabhängige Ansprüche abgefaßt, sie scheinen sich aber tatsächlich auf ein und denselben Gegenstand zu beziehen und unterscheiden sich voneinander offensichtlich nur durch voneinander abweichende Definitionen des Gegenstandes, für den Schutz begehrt wird. Somit sind die Ansprüche nicht knapp gefaßt. Ferner mangelt es den Ansprüchen insgesamt an Klarheit, da es aufgrund der Vielzahl unabhängiger Ansprüche schwierig, wenn nicht unmöglich ist, den Gegenstand des Schutzbegehrens zu ermitteln, und damit Dritten die Feststellung des Schutzzumfangs in unzumutbarer Weise erschwert wird. Außerdem ist unklar, inwieweit sich die Gegenstände der Ansprüche 1 bzw. 4 von denen der Ansprüche 2 bzw. 5 unterscheiden.
Aus diesen Gründen erfüllen die genannten Ansprüche nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT.
5. Anspruch 24 ist durch die Verwendung des Ausdrucks "insbesondere" unklar, welcher keine limitierende Wirkung hat. Somit bezieht sich der Anspruch auch auf Verfahren, welche nicht zu einer der anmeldungsgemäßen EPO-Zusammensetzungen führt.
6. Die Beschreibung steht nicht, wie in Regel 5.1 a) iii) PCT vorgeschrieben, in Einklang mit den Ansprüchen.


5

Ansprüche

1. EPO-Zusammensetzung,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie im wesentlichen aus glykosylierten EPO-Molekülen besteht,
10 die eine Anzahl von durchschnittlich mindestens 4,3 N-Acetyl-
Lactosamin-Einheiten bezogen auf eine N-gebundene
Kohlenhydratkette eines EPO-Moleküls bzw. von durchschnittlich
mindestens 13,0 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf die
Gesamt-N-Glycosilierung eines EPO-Moleküls enthalten.
- 15 2. EPO-Zusammensetzung,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie aus glykosylierten EPO-Molekülen besteht, die eine mittlere
Anzahl von durchschnittlich mindestens 4,3 N-Acetyl-Lactosamin-
20 Einheiten bezogen auf eine N-gebundene Kohlenhydratkette bzw. von
durchschnittlich mindestens 13,0 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten
bezogen auf die Gesamt-N-Glycosilierung eines EPO-Moleküls enthal-
ten.
- 25 3. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten mindestens 4,5
bezogen auf eine N-gebundene Kohlenhydratkette bzw. 13,5 bezogen
auf die Gesamt-N-Glycosilierung ist.

30

GEÄNDERTES BLATT



4. EPO-Zusammensetzung,
dadurch gekennzeichnet,

daß sie im wesentlichen aus glykosilierten EPO-Molekülen besteht,
die einen Wert für das Produkt aus der durchschnittlichen Anzahl von
N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf eine N-gebundene
Kohlenhydratkette eines EPO-Moleküls multipliziert mit dem mittleren
Sialinsäuregehalt pro Molekül EPO von mindestens 43,3 bzw.
mindestens 130 bezogen auf die Gesamt-N-Glycosilierung eines EPO-
Moleküls aufweisen.

5. EPO-Zusammensetzung,
dadurch gekennzeichnet,

daß sie aus glykosilierten EPO-Molekülen besteht, die einen mittleren
Wert für das Produkt aus der durchschnittlichen Anzahl von N-Acetyl-
Lactosamin-Einheiten bezogen auf eine N-gebundene Kohlen-
hydratkette eines EPO-Moleküls multipliziert mit dem mittleren
Sialinsäuregehalt pro Molekül EPO von mindestens 43,3 bzw.
mindestens 130 bezogen auf die Gesamt-N-Glycosilierung eines EPO-
Moleküls aufweisen.


6. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,

daß der Wert des Produkts mindestens 46,7 bezogen auf eine N-
gebundene Kohlenhydratkette bzw. mindestens 140 bezogen auf die
Gesamt-N-Glycosilierung ist.

7. EPO-Zusammensetzung,
dadurch gekennzeichnet,

daß sie die Merkmale von mindestens zwei der Ansprüche 1, 2, 4
und 5 aufweist.

8. EPO-Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie ein Gemisch aus 2 bis 5 Isoformen umfasst.
- 5 9. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie ein Gemisch aus 3 bis 4 Isoformen umfasst.
- 10 10. EPO-Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie eine spezifische Aktivität in vivo von mindestens
175 000 IU/mg Protein aufweist.
- 15 11. EPO-Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie eine spezifische Aktivität in vivo von mindestens
200 000 IU/mg Protein aufweist.
- 20 12. EPO-Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der mittlere Sialinsäuregehalt pro Molekül mindestens 11 beträgt.
- 25 13. EPO-Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die EPO-Moleküle das Produkt einer Expression exogener DNA
in Säugerzellen sind.
- 30 14. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie aus glykosilierten EPO-Molekülen aus CHO-Zellen besteht,
wobei der Anteil von Kohlenhydratketten mit N-Acetyl-Lactosamin-



Verlängerungen (Repeats) bezogen auf die Gesamtzahl von N-gebundenen Kohlenhydratketten mindestens 30% ist.

15. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 14,

5

dadurch gekennzeichnet,

daß der Wert für das Produkt aus dem Anteil von Kohlenhydratketten mit N-Acetyl-Lactosamin-Repeats bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten und dem Anteil von tetraantennären Strukturen bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten mindestens 2400 ist.

10

16. EPO-Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 12,

dadurch gekennzeichnet,

daß die EPO-Moleküle das Produkt einer Expression endogener DNA in humanen Zellen sind.

15

17. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 16,

dadurch gekennzeichnet,

daß der Anteil von Kohlenhydratketten mit N-Acetyl-Lactosamin-Repeats bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten mindestens 10% ist.

20

18. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 17,

dadurch gekennzeichnet,

daß der Wert für das Produkt aus dem Anteil von Kohlenhydratketten mit N-Acetyl-Lactosamin-Repeats bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten und dem Anteil von tetraantennären Strukturen bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten mindestens 800 ist.

25

30

19. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 13 oder 16,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Kultivierung der Zellen in einem serumfreien Medium erfolgt
ist.

5

20. Pharmazeutisches Präparat,
dadurch gekennzeichnet,
daß es als Wirkstoff eine EPO-Zusammensetzung nach einem der
Ansprüche 1 bis 19 als Wirkstoff gegebenenfalls zusammen mit
üblichen pharmazeutischen Verdünnungs-, Hilfs- und Trägermitteln
enthält.

10

21. Verfahren zur Gewinnung einer EPO-Zusammensetzung, insbesondere
nach einem der Ansprüche 1 bis 20,

15


- dadurch gekennzeichnet,**
daß man die EPO-Zusammensetzung mit den gewünschten Merkma-
len erhält durch mindestens eine der Maßnahmen:

- (a) Auswahl einer geeigneten Produktionszelle, welche in der Lage
ist, Kohlenhydratketten mit einem hohen Anteil N-Acetyl-
Lactosamin-Einheiten zu erzeugen,
- (b) Auswahl von geeigneten Kultivierungsbedingungen bei der
Zellkultur, um Kohlenhydratketten mit einem hohen Anteil N-
Acetyl-Lactosamin-Einheiten zu erzeugen und
- (c) Abtrennung unerwünschter Bestandteile aus einer bekannten
Zusammensetzung von EPO-Molekülen unter Anreicherung von
EPO-Molekülen, die Kohlenhydratketten mit einem hohen
Anteil N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten enthalten.

20

25

30



22. Verfahren nach Anspruch 21,
dadurch gekennzeichnet,
daß Maßnahme (b) die Zugabe einer Mischung von mindestens 2
Kohlenhydraten und vorzugsweise mindestens 3 Kohlenhydraten zum
Kulturmedium umfaßt.
23. Verfahren nach Anspruch 22,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine Glucose oder/und Mannose oder/und Galactose enthaltende
Kohlenhydratmischung verwendet wird.
24. Verfahren nach Anspruch 21,
dadurch gekennzeichnet,
daß Maßnahme (b) die kontrollierte und bedarfsgerechte Zugabe von
Nährstoffen, umfassend mindestens eine essentielle Aminosäure
oder/und mindestens ein Kohlenhydrat abhängig vom Bedarf der
Zellen umfaßt.
25. Verfahren nach Anspruch 24,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Nährstoffbedarf der Zellen abhängig von der im
Kulturmedium gemessenen Konzentration an Glutamin ermittelt wird.
26. Verfahren nach Anspruch 24 oder 25,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Nährstoffe bedarfsgerecht über die gesamte
Wachstumsphase der Zellen zugegeben werden.
27. Verfahren nach einem der Ansprüche 24 bis 26,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Nährstoffe eine Mischung von mindestens 2 Kohlenhydraten
und vorzugsweise mindestens 3 Kohlenhydraten umfassen.

28. Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 27,
dadurch gekennzeichnet,
daß Maßnahme (b) die Kultivierung bei einer Temperatur zwischen 30 und 35,5°C, bevorzugt zwischen 33 und 35,0°C umfaßt.

5

29. Verfahren nach Anspruch 28,
dadurch gekennzeichnet,
daß Maßnahme (c) einen Reverse-Phase-Chromatographieschritt bei einem pH-Wert im Bereich von 6-8 umfaßt.

10

30. Verfahren nach Anspruch 29,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein Acetonitril-, Ethanol- oder Isopropanol als Eluent verwendet wird.

15

31. Verfahren nach Anspruch 21,
dadurch gekennzeichnet,
daß Maßnahme (c) einen Affinitätschromatographieschritt unter Verwendung von Triazinfarbstoffen umfaßt.

20

32. Verfahren nach Anspruch 21,
dadurch gekennzeichnet,
daß Maßnahme (c) einen Affinitätschromatographieschritt unter Verwendung von Lectinen umfaßt.

25

33. Verfahren zur Erhöhung der spezifischen Aktivität einer EPO-Zusammensetzung,
dadurch gekennzeichnet,
daß man EPO-Moleküle in der Zusammensetzung anreichert, die
- 30 (a) eine große Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten,
(b) einen hohen Wert des Produkts aus der Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten und dem Sialinsäuregehalt,

5

10

15

25

30

37. Verfahren nach Anspruch 33,

dadurch gekennzeichnet,


daß die Anreicherung

- (a) bei EPO aus CHO-Zellen bis auf einen Wert des Produkts aus dem mittleren Anteil von N-Acetyl-Lactosamin-Repeats bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten multipliziert mit dem mittleren Anteil an tetraantennären Kohlenhydratstrukturen von mindestens 2400 oder
- (b) bei EPO aus humanen Zellen bis auf einen Wert des Produkts aus dem mittleren Anteil von N-Acetyl-Lactosamin-Repeats bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten multipliziert mit dem mittleren Anteil an tetraantennären Kohlenhydratstrukturen von mindestens 800 erfolgt.

38. Verfahren nach einem der Ansprüche 33-37,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Anreicherung durch eine oder mehrere der Maßnahmen (a), (b) und (c) gemäß Anspruch 21 erfolgt.



copy

VERTRÄGER DER INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
FÜR DAS GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 17791P WO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 98/ 07876	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 03/12/1998	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 03/12/1997
Anmelder ROCHE DIAGNOSTICS GMBH		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 4 Blätter.



Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

- a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.



Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

- b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das



in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.



zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.



bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.



bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.



Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.



Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.



wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung



wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.



wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. _____



wie vom Anmelder vorgeschlagen



weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.



weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.



keine der Abb.

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6 C07K14/505 C12N15/16 C12N15/85 C12N5/06 C12N5/08
C12N5/10 A61K38/18

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 C12N C07K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	<p>TAKEUCHI M ET AL: "RELATIONSHIP BETWEEN SUGAR CHAIN STRUCTURE AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN PRODUCED IN CHINESE HAMSTER OVARY CELLS"</p> <p>PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, Bd. 86, Oktober 1989, Seiten 7819-7822, XP002053701</p> <p>in der Anmeldung erwähnt siehe Seiten 7821-7822 und Abbildung 3</p> <p style="text-align: center;">--- -/--</p>	<p>1-6, 9-12, 16-18, 20,21, 23,24, 26,32, 36,40-42</p>



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

14. Mai 1999

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

21/05/1999

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Mateo Rosell, A.M.

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 0 754 703 A (KIRIN BREWERY) 22. Januar 1997 siehe Spalte 2, Zeile 43 - Spalte 3, Zeile 15 siehe Spalte 12, Zeile 35-38 siehe Spalte 7, Zeile 15 - Spalte 8, Zeile 7 ---	1-6, 9-12, 16-18, 20,21, 23,24, 26,32, 36,40-42
X	WO 95 12684 A (AMGEN INC) 11. Mai 1995 siehe Seite 4, Zeile 11 - Seite 5, Zeile 28 ---	1,26-31
A	US 5 047 335 A (PAULSON JAMES ET AL) 10. September 1991 siehe Spalte 3, Zeile 30 - Spalte 4, Zeile 43 ---	1,7,8, 11,12, 15,16,19
A	FUKUDA M N ET AL: "SURVIVAL OF RECOMBINANT ERYTHROPOIETIN IN THE CIRCULATION: THE ROLE OF CARBOHYDRATES" BLOOD, Bd. 73, Nr. 1, Januar 1989, Seiten 84-89, XP000199651 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument und insbesondere Seite 88, linke Spalte und Fig. 6 ---	1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40
A	WATSON E ET AL: "STRUCTURE DETERMINATION OF THE INTACT MAJOR SIALYLATED OLIGOSACCHARIDE CHAINS OF RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN EXPRESSED IN CHINESE HAMSTER OVARY CELLS" GLYCOBIOLOGY, Bd. 4, Nr. 2, 1. Januar 1994, Seiten 227-237, XP000576965 siehe Zusammenfassung, Tabelle IV und discussion ---	1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40
A	NIMTZ M ET AL: "STRUCTURES OF SIALYLATED OLIGOSACCHARIDES OF HUMAN ERYTHROPOIETIN EXPRESSED IN RECOMBINANT BHK-21 CELLS" EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, Bd. 213, Nr. 1, 1. April 1993, Seiten 39-56, XP000576796 siehe Seiten 45-46, Tabelle 4 und discussion ---	1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40
	---	-/--

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	HOKKE C H ET AL: "STRUCTURAL ANALYSIS OF THE SIALYLATED N- AND O-LINKED CARBOHYDRATE CHAINS OF RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN EXPRESSED IN CHINESE HAMSTER OVARY CELLS. SIALYLATION PATTERNS AND BRANCH LOCATION OF DIMERIC N-ACETYLLACTOSAMINE UNITS" EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, Bd. 228, März 1995, Seiten 981-1008, XP000199646 siehe Figs. aus Seite 1002, discussion und Tabelle 5 ----	1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40
A	CHOI D ET AL: "Erythropoietin: physico- and biochemical analysis" JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B: BIOMEDICAL APPLICATIONS, Bd. 687, Nr. 1, 6. Dezember 1996, Seite 189-199 XP004062816 siehe das ganze Dokument und insbesondere Seiten 194-196 und Fig. 4 ----	1
A	EP 0 475 354 A (BEHRINGWERKE AG) 18. März 1992 siehe Seite 2-3 ----	1,8,11, 12,15,16
A	WO 96 35718 A (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH ;BURG JOSEF (DE); SCHNEIDER WALTER (DE);) 14. November 1996 siehe das ganze Dokument ----	1,32-34
A	EP 0 267 678 A (INTEGRATED GENETICS, INC.) 18. Mai 1988 siehe das ganze Dokument and insbesondere Seite 5, Zeile 54-58. -----	1,22, 32-34



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

T/EP 98/07876

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0754703	A	22-01-1997	AU 3815295 A US 5843713 A CN 1142229 A WO 9613516 A	23-05-1996 01-12-1998 05-02-1997 09-05-1996
WO 9512684	A	11-05-1995	AT 175999 T AU 8095494 A DE 69416166 D EP 0734450 A ES 2126793 T US 5459031 A	15-02-1999 23-05-1995 04-03-1999 02-10-1996 01-04-1999 17-10-1995
US 5047335	A	10-09-1991	NONE	
EP 0475354	A	18-03-1992	DE 4028800 A AU 661824 B AU 8376091 A CA 2051047 A JP 6105692 A PT 98917 A	12-03-1992 10-08-1995 19-03-1992 12-03-1992 19-04-1994 31-08-1992
WO 9635718	A	14-11-1996	AU 5817496 A CA 2220515 A EP 0830376 A JP 10506924 T	29-11-1996 14-11-1996 25-03-1998 07-07-1998
EP 267678	A	18-05-1988	US 4954437 A AU 7842987 A DK 478287 A FI 873897 A JP 63185396 A PT 85699 A, B	04-09-1990 16-03-1989 16-03-1988 16-03-1988 30-07-1988 01-10-1987



EP 87 30 8130

DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int. Cl.4)
X	WO-A-8 603 520 (GENETICS INSTITUTE INC.) * Whole document *	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8	C 12 N 15/00 C 12 P 21/02 C 12 N 5/00
Y	---	3	
Y	GENE, vol. 38, no. 1/3, 1985, pages 111-118, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, NL; T.V. RAMABHADHAN et al.: "High-level expression of the bovine growth hormone gene in heterologous mammalian cells" * Whole document *	3	
P, X	EP-A-0 236 059 (SNOW BRAND MILK PRODUCTS) * Whole document *	1, 5, 6	TECHNICAL FIELDS SEARCHED (Int. Cl.4) C 12 N C 12 P A 01 K
A	GB-A-2 171 304 (CHUGAI SEIYAKU K.K.)		
A	WO-A-8 604 068 (GENETICS INSTITUTE INC.) -----		
The present search report has been drawn up for all claims			
Place of search THE HAGUE		Date of completion of the search 03-10-1987	Examiner DESCAMPS J.A.
CATEGORY OF CITED DOCUMENTS			
X : particularly relevant if taken alone Y : particularly relevant if combined with another document of the same category A : technological background O : non-written disclosure P : intermediate document		T : theory or principle underlying the invention E : earlier patent document, but published on, or after the filing date D : document cited in the application L : document cited for other reasons & : member of the same patent family, corresponding document	

?

NOT

SURE


WHAT

CASE

FROM

?

(NOT PUT
OF 9501)



PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : C07K 14/505, C12N 15/16, 15/85, 5/06, 5/08, 5/10, A61K 38/18		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/28346
		(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:	10. Juni 1999 (10.06.99)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP98/07876		(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).	
(22) Internationales Anmeldedatum: 3. Dezember 1998 (03.12.98)		Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>	
(30) Prioritätsdaten: 197 53 681.6 3. Dezember 1997 (03.12.97) DE 98113415.8 17. Juli 1998 (17.07.98) EP			
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): ROCHE DIAGNOSTICS GMBH [DE/DE]; Sandhofer Strasse 122-132, D-68305 Mannheim (DE).			
(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BURG, Josef [DE/DE]; An der Bärenmühle 1, D-82362 Weilheim (DE); SELLINGER, Karl-Heinz [DE/DE]; Trifthofstrasse 15, D-82362 Weilheim (DE); HASELBECK, Anton [DE/DE]; Bärenmühlweg 50, D-82362 Weilheim (DE); KOLL, Hans [DE/DE]; Adlerweg 2, D-82362 Weilheim (DE).			
(74) Anwälte: WEICKMANN, H. usw.; Kopernikusstrasse 9, D-81679 München (DE).			
(54) Title: ERYTHROPOIETIN WITH HIGH SPECIFIC ACTIVITY			
(54) Bezeichnung: ERYTHROPOIETIN MIT HOHER SPEZIFISCHER AKTIVITÄT			
(57) Abstract <p>The invention relates to new EPO compositions with a high specific activity, characterised by a high proportion of N-acetyl-lactosamin units and/or tetra-antenna branches in the carbon hydrate structure. The invention also relates to a method for preparing such EPO products.</p>			
(57) Zusammenfassung <p>Die Erfindung betrifft neue EPO-Zusammensetzungen mit hoher spezifischer Aktivität, die durch einen hohen Anteil an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten oder/und tetraantennären Verzweigungen in der Kohlenhydratstruktur gekennzeichnet sind. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Gewinnen solcher EPO-Produkte.</p>			

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshjan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Erythropoietin mit hoher spezifischer Aktivität

Beschreibung

5

Die Erfindung betrifft neue EPO-Zusammensetzungen mit hoher spezifischer Aktivität, die durch einen hohen Gehalt an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten oder/und tetraantennären Verzweigungen in der Kohlenhydratstruktur gekennzeichnet sind. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum

10 Gewinnen solcher EPO-Produkte.

15

Erythropoietin (EPO) ist ein humanes Glycoprotein, welches die Produktion von roten Blutzellen stimuliert. EPO kommt im Blutplasma von gesunden Personen nur in sehr geringen Konzentrationen vor, so daß eine Bereitstellung in größeren Mengen auf diese Weise nicht möglich ist.

20

EP-B1-O 148 605 und EP-B1-O 205 564 beschreiben die Herstellung von rekombinantem humanen EPO in CHO-Zellen. Das in EP-B1-O 148 605 beschriebene EPO weist ein höheres Molekulargewicht als urinäres EPO und keine O-Glykosylierung auf. Das in EP-B1-O 205 564 beschriebene EPO aus

25

Weiterhin ist die Gewinnung von humanem EPO aus dem Urin von Patienten mit aplastischer Anämie bekannt (Miyake et al., J. Biol. Chem. 252 (1977), 5558-5564).

30

Rekombinantes und urinäres EPO wird als Gemisch verschiedener Isoformen gewonnen, von denen bekannt ist, daß sie sich in ihrem Sialylierungsgrad unterscheiden. Diese EPO-Isoformen weisen unterschiedliche isoelektrische Punkte auf und können durch isoelektrische Fokussierung bzw. Kapillarelektrophorese aufgetrennt werden (siehe Tsao et al., Biotech. Bioeng. 40 (1992), 1190-1196; Nieto et al., Anal. Commun. 33 (1996), 425-427; Tran et al., J. Chromatogr. 542 (1991), 459-471; Bietot et al., J. Chromatogr.

759 (1997), 177-184; Watson et al. Anal. Biochem. 210 (1993), 389-393). Die Isoformen mit der höchsten Anzahl von Sialinsäuren weisen die höchste spezifische Aktivität auf, während die mit der niedrigsten Anzahl die geringste Aktivität besitzen (siehe z.B. Imai et al., Eur. J. Biochem. 194
5 (1990), 457-462; EP-A-O 428 267).

Takeuchi et al., (Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86 (1989), 7819-7822) beschreiben einen Zusammenhang der biologischen Aktivität mit dem Sialinsäuregehalt und dem Verhältnis von bi- und tetraantennären Kohlenhy-
10 dratstrukturen. Takeuchi et al. kommen weiterhin zur Schlußfolgerung, daß die in den EPO-Kohlenhydratstrukturen vorhandenen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten nicht mit der biologischen Aktivität korrelieren.

Fukuda et al. (Blood 73 (1989), 84-89) befassen sich mit der Geschwindigkeit der Elimination von EPO aus dem Blutkreislauf, die wesentlich zur biologischen Aktivität beiträgt, und kommen zu dem Schluß, daß EPO mit
15 einer größeren Anzahl an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten schneller aus dem Kreislauf entfernt wird als EPO ohne Lactosamin-Einheiten. Morimoto et al. (Glycoconjugate J. 13 (1996), 1093-1120) beschreiben die Auftrennung von EPO-Isoformen mittels Mono-Q-Chromatographie, so daß die einzelnen
20 Fraktionen jeweils aus nur noch wenigen Isoformen bestehen. Die mit diesen Fraktionen durchgeführten Untersuchungen zeigen eine Gleichverteilung aller Strukturen in allen Fraktionen. Es wird keine Korrelation des Gehalts an bi- oder triantennären Strukturen oder des Gehalts an N-Acetyl-
25 Lactosamin-Einheiten mit der spezifischen Aktivität gefunden.

Somit geht aus dem genannten Stand der Technik hervor, daß eine generelle Korrelation der biologischen Aktivität mit der Zuckerstruktur besteht, insbesondere im Hinblick auf den Gehalt an Sialinsäuren. Es findet sich
30 jedoch keinerlei Hinweis, daß der Anteil an tetraantennären Strukturen oder/und der Anteil an N-Acetyl-Lactosamin eine direkte Korrelation mit der biologischen Aktivität besitzt.

Überraschenderweise wurde bei der Aufreinigung von EPO-Präparationen festgestellt, daß eine Erhöhung des Anteils an tetraantennären Kohlenhydratstrukturen oder/und N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten in der Kohlenhydratstruktur zu einer signifikanten Verbesserung der spezifischen biologischen Aktivität führt. Dies trifft insbesondere zu bei der Herstellung von EPO in einer humanen Zelllinie gemäß der europäischen Anmeldung 97 112 640.4.

Vergleichende Aktivitätsuntersuchungen einzelner EPO-Präparationen oder EPO-Isoformen, deren Kohlenhydratstruktur sich im wesentlichen nur im Gehalt der N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten (LE-Einheiten) unterscheidet, zeigen eine signifikant höhere Aktivität für die Präparationen oder Isoformen mit dem höheren Anteil an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bei gleichen Sialinsäuregehalt und bei etwa gleicher Antennarität. Unter Antennarität wird in diesem Zusammenhang der relative, mittlere Gehalt (in %) an bi-, tri- bzw. tetraantennären N-gebundenen Kohlenhydratketten der EPO-Präparationen bzw. der isolierten EPO-Isoformen bezüglich der Gesamtzahl N-gebundener Kohlenhydratketten verstanden. Außerdem wurde gefunden, daß gerade in Präparationen oder Isoformen mit einem erhöhten Anteil an triantennären Strukturen der Gesamtgehalt an Lactosamin-Einheiten, für die in vivo Aktivität von erheblicher Bedeutung ist. Durch eine Erhöhung des Gesamtgehalts an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten, z. B. in Form von zusätzlichen Verlängerungen der Core-Struktur mit LE-Einheiten (sog. Repeats), kann die biologische Aktivität erheblich gesteigert werden. Weiterhin wurde festgestellt, daß durch Erhöhung des Anteils an tetraantennären Strukturen eine Verbesserung der biologischen Aktivität erreicht werden kann.

Ist man folglich bestrebt, ein EPO-Präparat mit möglichst hoher spezifischer Aktivität und in hoher Ausbeute zu erzeugen, so ist bei der Auswahl der Aufreinigungsschritte, der Produktionszellen oder/und bei deren Kultivierung auf einen möglichst hohen Anteil von tetraantennären Kohlenhydrat-

strukturen oder/und einen möglichst hohen Gehalt an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten zu optimieren.

5 Ein erster Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft eine EPO-Zusammensetzung, die im wesentlichen aus glykosilierten EPO-Molekülen besteht, die einen Anteil von mindestens 75% vorzugsweise mindestens 80%, besonders bevorzugt mindestens 85% und am meisten bevorzugt mindestens 90% tetraantennären Strukturen bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten, d.h. die Summe von bi-, tri- und tetraantennären
10 Strukturen, enthalten.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine EPO-Zusammensetzung, die im wesentlichen aus glykosilierten EPO-Molekülen besteht, die eine Anzahl von durchschnittlich mindestens 3,7, vorzugsweise von mindestens 4,0
15 besonders bevorzugt von mindestens 4,3 und am meisten bevorzugt von mindestens 4,5 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf die mittlere Zusammensetzung pro N-gebundener Kohlenhydratkette des EPO-Moleküls bzw. eine Anzahl von mindestens 11,1, vorzugsweise von mindestens 12,0, besonders bevorzugt von mindestens 13,0 und am meisten bevorzugt von
20 mindestens 13,5 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf alle 3 N-gebundenen Kohlenhydratstrukturen (Gesamt-N-Glycosilierung) des EPO-Moleküls enthalten.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine EPO-Zusammensetzung, die
25 im wesentlichen aus glykosilierten EPO-Molekülen besteht, die einen Wert für das Produkt aus der durchschnittlichen Gesamtzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten pro EPO Molekül multipliziert mit dem mittleren Sialinsäuregehalt pro Molekül EPO von mindestens 130, vorzugsweise von mindestens 135, besonders bevorzugt von mindestens 140 und am meisten
30 bevorzugt mindestens 160 aufweisen.

Die Angabe "im wesentlichen" bedeutet in diesem Zusammenhang, daß die gewünschten EPO-Moleküle in einem Anteil von vorzugsweise mindestens 80%, besonders bevorzugt von mindestens 90% und am meisten bevorzugt von mindestens 95% bezogen auf die Gesamtzahl der EPO-Moleküle in der Zusammensetzung vorhanden sind.

Noch ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine EPO-Zusammensetzung, die aus glykosilierten EPO-Molekülen besteht, die einen mittleren Anteil von mindestens 75%, vorzugsweise von mindestens 80% und besonders bevorzugt von mindestens 85% tetraantennären Strukturen bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten enthalten.

Außerdem betrifft die Erfindung eine EPO-Zusammensetzung, die aus glykosilierten EPO-Molekülen besteht, die eine mittlere Anzahl von durchschnittlich mindestens 3,7, vorzugsweise von mindestens 4,0 und besonders bevorzugt von mindestens 4,3, und am meisten bevorzugt von mindestens 4,5 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf die mittlere Zusammensetzung pro N-gebundener Kohlenhydratkette des EPO-Moleküls bzw. eine Anzahl von mindestens 11,1, vorzugsweise von mindestens 12,0, besonders bevorzugt von mindestens 13,0 und am meisten bevorzugt von mindestens 13,5 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf alle 3 N-gebundenen Kohlenhydratstrukturen des EPO-Moleküls enthalten.

Die Höchstgrenze des Anteils an tetraantennären Strukturen kann bis zu 100% der gesamten Kohlenhydratketten reichen, wobei jede tetraantennäre Struktur 4 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten in der core-Struktur des N-gebundenen Zuckers enthält. Zusätzliche N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten als sogenannte Repeats, die als Verlängerungen an der core-Struktur vorkommen, können die Zahl der N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten sowohl pro Kohlenhydratstruktur, als auch in der Gesamtglycosilierung erhöhen. Die Anzahl an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten pro Glykosilierungsstelle (d.h. pro N-gebundener Kohlenhydratstruktur) kann somit bis zu 6 (tetraantennäre

Struktur und 2 zusätzliche N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten in Form von Repeats) betragen (vgl. Fig. 1) oder - bei Strukturen mit mehr als 2 zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten - sogar noch höher sein. Bezogen auf die Gesamtglykosilierung (3 N-gebundene Kohlenhydratstrukturen) kann die Anzahl der N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bis zu 18 oder höher betragen.

Noch ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine EPO-Zusammensetzung, die aus glykosilierten Molekülen besteht, die einen mittleren Wert für das Produkt aus der durchschnittlichen Gesamtzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten des EPO-Moleküls multipliziert mit dem mittleren Sialinsäuregehalt pro Molekül EPO von mindestens 130, vorzugsweise von mindestens 135 besonders bevorzugt von mindestens 140 und am meisten bevorzugt von mindestens 160 aufweisen.

15

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine EPO-Zusammensetzung, welche die Merkmale von mindestens zwei oder mehreren der zuvor genannten Aspekte aufweist.

Die erfindungsgemäße Zusammensetzung kann aus einer oder mehreren Isoformen, d.h. EPO-Molekülen mit unterschiedlichen isoelektrischen Punkten bei der isoelektrischen Fokussierung, bestehen. Vorzugsweise umfasst die erfindungsgemäße Zusammensetzung ein Gemisch aus mindestens 2, z.B. aus 2 bis 5 Isoformen, insbesondere ein Gemisch aus 3 oder 4 Isoformen.

25

Die spezifische Aktivität der erfindungsgemäßen Zusammensetzung ist vorzugsweise mindestens 175 000 IU/mg, insbesondere mindestens 200 000 IU/mg in vivo (normozythämische Maus). Besonders bevorzugt ist die spezifische Aktivität im Bereich von etwa 200 000 bis 400 000 IU/mg oder 450 000 IU/mg Protein, am meisten bevorzugt im Bereich von 250 000 bis 400 000 IU/mg oder 450 000 IU/mg Protein.

30

Der mittlere Sialinsäuregehalt bzw. die mittlere Anzahl der Sialinsäurereste pro Molekül EPO beträgt in der erfindungsgemäßen Zusammensetzung vorzugsweise 11 bis 14, besonders bevorzugt mindestens 11,5 und am meisten bevorzugt mindestens 12,5.

5

Die erfindungsgemäße EPO-Zusammensetzung ist einerseits erhältlich aus EPO-Molekülen, die das Produkt einer Expression exogener DNA in Säugerzellen, z.B. in Nagetierzellen, wie etwa CHO- oder BHK-Zellen sind, wie sie in EP-B-O 205 564 beschrieben ist. Alternativ kann die Zusammen-

10

setzung auch aus EPO-Molekülen bestehen, welche das Produkt einer Expression endogener DNA nach Genaktivierung in humanen Zellen, z.B. in immortalisierten Zelllinien wie etwa Namalwa (Nadkarni et al., Cancer 23 (1969), 64-79), HT1080 (Rasheed et al., Cancer 33 (1973), 1027-1033) oder HeLa S3 (Puck et al., J. Exp. Meth. 103 (1956), 273-284) sind.

15

Derartige Verfahren sind in der europäischen Patentanmeldung 97 112 640.4 beschrieben, deren Offenbarung zum Bestandteil der vorliegenden Anmeldung gemacht wird.

Weitere wichtige Parameter für die biologische Aktivität von EPO sind der Anteil von Kohlenhydratketten mit Repeats, d.h. zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten, bezogen auf die Gesamtzahl von N-gebundenen Kohlenhydratketten sowie der Wert des Produkts dieses Repeat-Anteils mit dem Anteil von tetraantennären Kohlenhydratketten bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten. Bei EPO aus CHO-Zellen liegt der Repeat-Anteil vorzugsweise bei mindestens 30%, besonders bevorzugt bei mindestens 35% und am meisten bevorzugt bei mindestens 40%. Bei EPO aus humanen Zellen wie etwa HeLa-Zellen liegt der Repeat-Anteil bei vorzugsweise mindestens 10%, besonders bevorzugt bei mindestens 12% und am meisten bevorzugt bei mindestens 14%. Dementsprechend liegt bei

20

25

30

Strukturen bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten vorzugsweise bei mindestens 2400, besonders bevorzugt bei mindestens 2800 und am meisten bevorzugt bei mindestens 3400. Bei EPO aus humanen Zellen liegt der Wert vorzugsweise bei mindestens 800, besonders
5 bevorzugt bei mindestens 960 und am meisten bevorzugt bei mindestens 1100.

Besonders bevorzugt wird eine EPO-Zusammensetzung verwendet, die durch Kultivierung von EPO-Produktionszellen in einem Kulturmedium mit
10 geringem Serumgehalt, z.B. maximal 1% (v/v) oder insbesondere in einem serumfreien Kulturmedium hergestellt wurde (vgl. hierzu WO 96/35718). Beispiele für geeignete Kulturmedien sind RPMI 1640 oder DMEM.

Die erfindungsgemäße EPO-Zusammensetzung kann als pharmazeutisches
15 Präparat gegebenenfalls zusammen mit üblichen pharmazeutischen Verdünnungs-, Hilfs- und Trägermitteln formuliert werden. Die erfindungsgemäße EPO-Zusammensetzung, die zur Herstellung eines pharmazeutischen Präparats eingesetzt werden kann, hat eine Reinheit von vorzugsweise mindestens 99% und besonders bevorzugt von mindestens 99,9% bei
20 Bestimmung durch Reverse Phase-HPLC (z.B. auf einer Vydac C4-Säule) oder/und Größenausschlußchromatographie (z.B. auf einer TSK 2000SW Ultrapac-Säule).

Außerdem weist die erfindungsgemäße Zusammensetzung einen DNA-
25 Gehalt von vorzugsweise < 10 pg, besonders bevorzugt < 5 pg und am meisten bevorzugt < 1 pg DNA pro 10 000 IU Protein auf. Außerdem ist die erfindungsgemäße Zusammensetzung vorzugsweise weitgehend frei von bakteriellen Verunreinigungen (< 1 CFU/ml) und Endotoxinen (< 1 EU/10 000 IU Protein).

30

Die Bestimmung des DNA-Gehalts kann durch einen Hybridisierungstest mit radioaktiver oder fluoreszenzmarkierter DNA erfolgen. Als Sonden-DNA wird



z.B. kommerziell erhältliche aufgereinigte Human-DNA verwendet. Die Human-DNA kann zudem als Standard für den Test eingesetzt werden. Die untere Nachweisgrenze eines solchen Hybridisierungstests beträgt etwa 0,3 pg/10 000 IU EPO. Der Keim- und Endotoxingehalt in der EPO-Präparation kann nach standardisierten Methoden bestimmt werden, wie sie in Pharm. Eu. oder USP beschrieben sind.

Eine EPO-Zusammensetzung, die vorzugsweise die erfindungsgemäß erwünschten Merkmale aufweist, ist erhältlich durch mindestens eine der folgenden Maßnahmen:

- (a) Auswahl einer geeigneten Produktionszellelinie, welche in der Lage ist, Kohlenhydratketten mit einem hohen Anteil tetraantennärer Strukturen oder/und N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten zu erzeugen,
- (b) Auswahl von geeigneten Kultivierungsbedingungen bei der Zellkultur, um Kohlenhydratketten mit einem hohen Anteil tetraantennärer Struktur oder/und N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten zu erzeugen und
- (c) Abtrennung unerwünschter Bestandteile aus einer bekannten Zusammensetzung von EPO-Molekülen unter Anreicherung von EPO-Molekülen, die Kohlenhydratketten mit einem hohen Anteil tetraantennärer Strukturen oder/und N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten enthalten.

Maßnahme (a) umfaßt die Auswahl einer geeigneten Produktionszelle. Einerseits kann man hier Zellen verwenden, von denen bekannt ist, daß sie eine Tendenz aufweisen, die gewünschten Kohlenhydratkettenstrukturen mit großer Ausbeute herzustellen. Beispiele für solche Zelllinien sind vom Hamster abgeleitete Zellen wie CHO oder BHK und humane Zelllinien wie HeLa, Namalwa, HT1080 oder davon abgeleitete Zelllinien. Besonders bevorzugt sind HeLaS3-Zellen oder modifizierte CHO-Zellen.

Andererseits können geeignete Produktionszellen auch gezielt erzeugt werden, indem bestimmte Glykosilierungsenzyme in der Zelle überexprimiert

werden, z.B. durch rekombinante Expression oder/und durch endogene Genaktivierung. Beispiele solcher Glykosilierungsenzyme sind Sialyltransferasen, N-Acetyl-Glucosaminyltransferasen und Galactosyltransferasen.

5 Maßnahme (b) umfaßt die Auswahl geeigneter Kultivierungsbedingungen bei der Zellkultur. In einer ersten Ausführungsform der Erfindung umfaßt Maßnahme (b) die Zugabe einer Mischung von mindestens zwei und vorzugsweise mindestens drei Kohlenhydraten zum Kulturmedium. Die Kohlenhydrate werden vorzugsweise aus Mono- und Disacchariden wie
10 etwa Glucose, Glucosamin, Ribose, Fructose, Galactose, Mannose, Saccharose, Lactose, Mannose-1-Phosphat, Mannose-1-Sulfat und Mannose-6-Sulfat ausgewählt. Beispielsweise sind Nährmedien geeignet, die Glucose oder/und Mannose oder/und Galactose enthalten. Besonders gute Ergebnisse wurden mit Nährmedien erzielt, die eine Mischung von Glucose,
15 Galactose und Mannose, beispielsweise im Masseverhältnis von 1:(0,5-3):(1-5) und insbesondere von 1:(0,7-2,4):(1,8-4,0) enthalten, wobei die Kohlenhydrate jeweils besonders bevorzugt in der D(+)-Form eingesetzt werden. Die Gesamtkonzentration aller Zucker liegt während der Fermentation vorzugsweise in einem Bereich von 0,1 bis 10 g/l, besonders
20 bevorzugt in einem Bereich von 2 bis 6 g/l im Kulturmedium. Vorzugsweise erfolgt die Zugabe der Kohlenhydratmischung abhängig vom jeweiligen Bedarf der Zellen wie im folgenden weiter ausgeführt wird.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfaßt Maßnahme (b)
25 die kontrollierte und vorzugsweise bedarfsgerechte Zugabe von Nährstoffen, umfassend mindestens eine für die kultivierte Zelllinie essentielle Aminosäure oder/und mindestens ein Kohlenhydrat, abhängig vom jeweiligen Bedarf der Zellen. Auf diese Weise wird selbst bei einer Hochzelldichtefermentation (Zelldichte bei der Ernte $> 10 \times 10^5$ Zellen/ml und vorzugsweise $> 20 \times 10^5$ Zellen/ml) in Großfermentern (Volumen > 1 l, z.B. 50 - 10.000 l) eine
30 deutlich verbesserte Glykosilierung erhalten. Hierzu wird kontinuierlich oder in geeigneten Zeitintervallen, z.B. mindestens einmal täglich, die



Konzentration von Parametern bestimmt, die in Korrelation zum Nährstoffbedarf der Zellen stehen und deren Verbrauchsraten ermittelt. Auf diese Weise können die für den Bedarf der Zellen benötigten Nährstoffe quantitativ oder/und qualitativ ermittelt werden. Solche Parameter können

5 Nährstoffe oder Stoffwechselprodukte der Zellen sein, wie etwa die Glutamin-, die Ammonium-, die Glucose- oder/und die Lactatkonzentration, insbesondere die Glutamin-Konzentration.

Die gemäß diesem Aspekt der Erfindung zugegebenen Nährstoffe umfassen

10 essentielle Aminosäuren, z.B. Glutamin oder/und Tryptophan, oder/und Kohlenhydrate, sowie vorzugsweise weiterhin nichtessentielle Aminosäuren, Vitamine, Spurenelemente, Salze oder/und Wachstumsfaktoren, z.B. Insulin. Besonders bevorzugt umfassen die Nährstoffe mindestens eine essentielle Aminosäure und mindestens ein Kohlenhydrat. Diese Nährstoffe werden

15 vorzugsweise in gelöstem Zustand dem Kulturmedium zugesetzt. Die Nährstofflösungen enthalten vorzugsweise zumindest Glutamin und Kohlenhydrate, insbesondere eine Mischung aus mindestens 2 Kohlenhydraten wie zuvor genannt. Besonders bevorzugt wird eine Mischung von Glucose, Galactose und Mannose eingesetzt. Weiterhin ist

20 bevorzugt, daß die Zugabe der Nährstoffe über die gesamte Wachstumsphase der Zellen bedarfsgerecht, d.h. abhängig von der im Kulturmedium gemessenen Konzentration der ausgewählten Parameter erfolgt.

25 Das Mengenverhältnis von Glutamin zu Kohlenhydraten in der Nährstofflösung wird vorzugsweise so gewählt, daß es dem Verbrauchsverhältnis im Fermenter im wesentlichen entspricht. Auf diese Weise kann eine weitgehend gleichbleibende Konzentration einzelner Substrate im Fermenter erreicht werden. Vorzugsweise wird die Konzentration von Glutamin auf

30 einem Wert gehalten, der $< 150 \text{ mg/l}$ im Kulturmedium ist und die Entstehung einer Ammoniumkonzentration $\geq 2,3 \text{ mmol/l}$ im Kulturmedium verhindert. Die Gesamtkonzentration der Zucker liegt während der

Fermentation - wie bereits ausgeführt - vorzugsweise in einem Bereich von 0,1 bis 10 g/l, besonders bevorzugt in einem Bereich von 2 bis 6 g/l Kulturmedium.

- 5 Die verwendete Nährstofflösung enthält ein Masseverhältnis von Glutamin zu Zuckern, das vorzugsweise im Bereich von 1:3 bis 20 und besonders bevorzugt von 1:5 bis 15, bezogen auf die gesamten Zucker, liegt. Bei Verwendung einer Nährstofflösung, die Glutamin sowie die drei Zucker
10 Glucose, Galactose und Mannose enthält, liegt das Masseverhältnis von Glutamin zu den Zuckern vorzugsweise bei 1:(1 bis 3):(1 bis 5):(2 bis 8) und besonders bevorzugt bei 1:(1,5 bis 2,2):(1,5 bis 3,6):(4 bis 6).

- Die Kultivierung wird vorzugsweise als wiederholt satzweiser Betrieb durchgeführt, wobei nach einer Wachstumsphase ein Teil der Kulturbrühe
15 geerntet wird und der Rest der Kulturbrühe im Fermenter bleibt, der anschließend wieder bis zum Arbeitsvolumen mit frischem Medium befüllt wird. Durch das erfindungsgemäße Verfahren kann glykosiliertes EPO in sehr hohen Ausbeuten geerntet werden. So beträgt die Konzentration zum Erntezeitpunkt beispielsweise mindestens 30 mg und insbesondere
20 mindestens 40 mg EPO pro l Kulturmedium.

- Noch ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Verfahren zur Gewinnung von EPO aus eukaryontischen Zellen, wobei die eukaryontischen Zellen in einem geeigneten Medium kultiviert und das EPO aus dem Kulturüberstand
25 gewonnen wird, wobei das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, daß die Kultivierung bei einer Temperatur von $\leq 36^{\circ}\text{C}$, vorzugsweise zwischen 30 und $35,5^{\circ}\text{C}$ und besonders bevorzugt zwischen 33 und $35,0^{\circ}\text{C}$ erfolgt. Überraschenderweise wurde nämlich festgestellt, daß durch Temperatursenkung bei der Kultivierung der Anteil an EPO mit gewünschter
30 Glykosilierung deutlich erhöht wird.

- Maßnahme (c) umfaßt die Abtrennung unerwünschter Bestandteile aus einer bekannten EPO-Zusammensetzung, die in ihrer Kohlenhydratstruktur die Spezifikationen der vorliegenden Anmeldung nicht erfüllt. Dies kann beispielsweise erfolgen durch chromatographische Aufreinigung der EPO-Präparationen, z.B. durch Affinitätschromatographie an Triazinfarbstoff-Gelen, vorzugsweise Cibacron Blue-Farbstoffgelen. Eine weitere Abtrennung unerwünschter Bestandteile kann auch mit hydrophober Interaktionschromatographie und Reversed Phase Chromatographie durchgeführt werden. Dafür geeignete Liganden sind Butyl-, Pentyl-, Octyl-, Octadecyl- und Phenyl-Reste. Der Reversed Phase-Chromatographie-Schritt wird vorzugsweise bei einem pH-Wert im Bereich von 6,0 bis 8,5 und besonders bevorzugt von 7,0 bis 8,0 durchgeführt. Geeignete Eluenten sind beispielsweise Acetonitril, Ethanol oder Isopropanol, vorzugsweise Acetonitril.
- Mit Kapillarzonenoelektrophorese-Analytik (CZE) können geeignete Fraktionen ermittelt, gepoolt und schließlich weiterverarbeitet werden. Außerdem kann unter Verwendung von Lectinen aus Tomaten oder Kartoffeln (Merkle, Cummings, J. Biol. Chem. 262 (1987), 8179-8189) eine direkte Anreicherung von EPO-Molekülen mit einem hohen Anteil an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten erfolgen. Bevorzugt werden solche Lectine z.B. in immobilisierter Form eingesetzt.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Erhöhung der spezifischen Aktivität einer EPO-Zusammensetzung, wobei man EPO-Moleküle in der Zusammensetzung anreichert, die

- (a) einen hohen Anteil an tetraantennären Kohlenhydratstrukturen,
- (b) eine große Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten,
- (c) einen hohen Wert des Produkts aus der Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten und dem Sialinsäuregehalt,
- (d) einen hohen Anteil von N-Acetyl-Lactosamin-Repeats oder/und

(e) einen hohen Wert des Produkts aus dem Anteil von N-Acetyl-Lactosamin-Repeats und dem Anteil an tetraantennären Kohlenhydratstrukturen aufweisen.

5 Diese Anreicherung kann durch eine oder mehrere der oben genannten Maßnahmen (a), (b) und (c) erfolgen.

Weiterhin wird die vorliegende Erfindung durch die nachfolgenden Figuren und Beispiele erläutert.

10

Es zeigen:

Figur 1: die Darstellung einer tetraantennären Kohlenhydratstruktur mit
zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten (Repeats) und
15 Sialinsäuren,

Figur 2: den relativen Anteil einzelner EPO-Isoformen in Abhängigkeit
von den dem Kulturmedium zugesetzten Kohlenhydraten,

Figur 3: die biologische Aktivität von EPO-Präparaten in Abhängigkeit
von den dem Kulturmedium zugesetzten Kohlenhydraten und

20 Figur 4: die biologische Aktivität von EPO-Isoformen in Abhängigkeit
vom Anteil der N-Acetyl-Lactosamin-Repeat-Einheiten.

Beispiel 1 Aufreinigung von EPO aus Kulturüberständen von Zelllinien

25 Im wesentlichen wurden zur Aufreinigung von EPO aus Zellkulturüberständen von humanen Zellen oder CHO-Zellen zwei Methoden verwendet, die sich in Anzahl und Prinzip der Chromatographieschritte unterschieden und abhängig von der Zusammensetzung des Mediums und der EPO-Konzentration eingesetzt wurden:

30

Methode 1: 1. Schritt: Blue-Sepharose-Säule
2. Schritt: Butyl-Sepharose-Säule

3. Schritt: Hydroxyapatit-Säule
4. Schritt: Aufkonzentrierung
Methode 2: 1. Schritt: Blue-Sepharose-Säule
2. Schritt: Hydroxyapatit-Säule
5 3. Schritt: Aufkonzentrierung
(alternativer 3. Schritt: RP-HPLC)

Beispiel für eine Aufreinigung eines Hela S3-Zellkulturüberstandes mit 2 %
(v/v) fötalem Kälberserum (FKS) nach Methode 1:

10

1. Blue Sepharose-Säule:

Eine 5 ml Hi-Trap-Blue-Säule (Blue-Sepharose-Fertigsäule von Pharmacia)
wurde mit mindestens 5 Säulenvolumina (SV) Puffer A (20 mM Tris-HCl,
15 pH, 7,0; 5 mM CaCl_2 ; 100 mM NaCl) äquilibriert. Anschließend wurden
70 ml Hela-Zellüberstand (ca. 245 μg EPO und 70-100 mg Gesamtprotein
enthaltend) über Nacht bei einem Fluß von 0,5 ml/min im Kreislaufverfahren
aufgezogen.

20 Die Säule wurde mit mindestens 5 SV Puffer B (20mM Tris-HCl, pH 7,0;
5 mM CaCl_2 ; 250 mM NaCl) und mindestens 5 SV Puffer C (20mM Tris-
HCl, pH 7,0; 0,2 mM CaCl_2 , 250 mM NaCl) bei 0,5 ml/min gewaschen. Der
Wascherfolg wurde über die Messung des Proteingehalts bei OD280
verfolgt.

25

Die Elution von EPO erfolgte mit Puffer D (100 mM Tris-HCl, pH 7,0;
0,2 mM CaCl_2 ; 2 M NaCl) bei einem Fluß von 0,5 ml/min. Die Elutions-
lösung wurde in 1-2 ml Fraktionen gesammelt.

30 Der EPO-Gehalt der Fraktionen, der Waschlösungen und des Durchlaufs
wurden über Reverse-Phase (RP)-HPLC durch Auftrag eines Aliquots auf
eine POROS R2/H-Säule (Boehringer Mannheim) bestimmt. Alternativ wurde

zur qualitativen Identifizierung EPO-haltiger Fraktionen ein immunologischer Dotplot durchgeführt.

5 EPO-haltige Fraktionen der Elution (8-12 ml) wurden gepoolt und auf eine Butyl-Sepharose-Säule aufgetragen.

Die Ausbeute nach der Blue-Sepharose-Säule betrug ca. 175 μ g EPO (entspricht ca. 70%). Im Allgemeinen betrug die Ausbeute nach Blue-Sepharose zwischen 50-75%.

10

2. Butyl-Sepharose-Säule (Hydrophobe-Interaktions-Chromatographie)

15 Eine selbsthergestellte 2-3 ml Butyl-Sepharose-Säule (Material: Toyopearl Butyl S650) wurde mit mindestens 5 SV Puffer D (100 mM Tris-HCl, pH 7,0; 0,2 mM CaCl_2 ; 2 M NaCl) äquilibriert und anschließend der EPO-haltige Blue-Sepharose-Pool aus 1. (ca. 150 μ g EPO) bei einem Fluß von 0,5 ml/min aufgezogen.

20 Die Säule wurde mit mindestens 5 SV Puffer E (20 mM Tris-HCl, pH 7,0; 2 M NaCl und 10 % Isopropanol) bei 0,5 ml/min gewaschen. Der Wascherfolg wurde über die Messung des Proteingehalts bei OD280 verfolgt.

25 Die Elution von EPO erfolgte mit Puffer F (20 mM Tris-HCl, pH 7,0; 2 M NaCl und 20 % Isopropanol) bei Raumtemperatur und einem Fluß von 0,5 ml/min. Die Elutionslösung wurde in 1-2 ml Fraktionen gesammelt.

30 Der EPO-Gehalt der Fraktionen, der Waschlösungen und des Durchlaufs wurden über RP-HPLC durch Auftrag eines Aliquots auf eine POROS R2/H-Säule bestimmt. Alternativ wurde zur qualitativen Identifizierung EPO-haltiger Fraktionen ein immunologischer Dotplot durchgeführt.

EPO-haltige Fraktionen der Elution (10-15 ml) wurden gepoolt und auf eine Hydroxy-apatit-Säule aufgetragen.

Die Ausbeute der Butyl-Sepharose-Säule betrug ca. 130 μ g EPO (entspricht ca. 85 %). Im Allgemeinen betrug die Ausbeute der Butyl-Sepharose zwischen 60-85% vom Auftrag der Blue-Sepharose-Pools.

3. Hydroxyapatit-Säule

10 Eine 5 ml Hydroxyapatit-Säule (Econo-Pac CHT II-Fertigsäule von BioRAD) wurde mit mindestens 5 SV Puffer F (20 mM Tris-HCl, pH 7,0; 2 M NaCl; 20% Isopropanol) äquilibriert und anschließend der EPO-haltige Butyl-Sepharose-Pool aus 2. (ca. 125 μ g EPO) bei einem Fluß von 0,5 ml/min aufgezogen.

15 Die Säule wurde mit mindestens 5 SV Puffer G (20 mM Tris-HCl, pH 7,0; 2 M NaCl) bei 0,5 ml/min gewaschen. Der Wascherfolg wurde über die Messung des Proteingehalts bei OD280 verfolgt.

20 Die Elution von EPO erfolgte mit Puffer H (10 mM Na-Phosphat, pH 7,0; 80 mM NaCl) bei einem Fluß von 0,5 ml/min. Die Elutionslösung wurde in 1-2 ml Fraktionen gesammelt.

25 Der EPO-Gehalt der Fraktionen, der Waschlösungen und des Durchlaufs wurden über RP-HPLC durch Auftrag eines Aliquots auf eine POROS R2/H-Säule bestimmt.

EPO-haltige Fraktionen der Elution (3-6 ml) wurden gepoolt. Die Ausbeute der Hydroxyapatit-Säule betrug ca. 80 μ g EPO (entspricht ca. 60%). Im
30 Allgemeinen betrug die Ausbeute der Hydroxyapatit-Säule zwischen 50-65% vom Auftrag der Butyl-Sepharose-Pools.

4. Aufkonzentrierung

Die gepoolten EPO-Fractionen aus dem Hydroxyapatit-Schritt wurden in Zentrifugationseinheiten mit einer Ausschlußgröße von 10 kD (z.B. Microsep von Filtron) auf eine Konzentration von 0,1-0,5 mg/ml aufkonzentriert, mit 0,01 % Tween 20 versetzt und in Aliquots bei -20°C gelagert.

Ausbeuteschema:

	EPO (μ g)	Ausbeute (%)
Ausgang	245	100
Blue-Sepharose	175	70
Butyl-Sepharose-Säule	130	53
Hydroxyapatit-Säule	80	33
Aufkonzentrierung	60	25

Die Reinheit des isolierten EPO war etwa > 90%, in der Regel sogar > 95%.

Zur Erhöhung der EPO-Ausbeute wurde auch die Methode 2 verwendet, bei der der Butyl-Sepharose-Schritt fehlte. Vor allem bei Zellkulturüberständen ohne oder mit 1 % (v/v) FKS-Zusatz ist diese Methode anwendbar und liefert isoliertes EPO von ungefähr gleicher Reinheit (90-95%). Die Anwesenheit von 5 mM CaCl_2 im Äquilibrationpuffer (Puffer F) für die Hydroxyapatit-Säule führte bei dieser Methode zu einer verbesserten Bindung und damit auch zu einem verbessert reproduzierbaren Elutionsverhalten von EPO beim Hydroxyapatit-Schritt. Deshalb wurde bei Methode 2 bei prinzipiell gleichem Ablauf wie Methode 1 mit folgenden Puffern durchgeführt:

1. Blue-Sepharose-Säule:

Äquilibrationpuffer (Puffer A): 20 mM Tris-HCl, pH 7,0;
5 mM CaCl_2 ; 100 mM NaCl

- 19 -

- Waschpuffer 1 (Puffer B): 20 mM Tris-HCl, pH 7,0;
5 mM CaCl_2 ; 250 mM NaCl
- Waschpuffer 2 (Puffer C): 20 mM Tris-HCl, pH 7,0;
5 mM CaCl_2 , 250 mM NaCl
- 5 Elutionspuffer (Puffer D): 100 mM Tris-HCl, pH 7,0;
5 mM CaCl_2 ; 2 M NaCl

2. Hydroxyapatit-Säule

- 10 Äquilibrierpuffer (Puffer F): 50 mM Tris-HCl, pH 7,0;
5 mM CaCl_2 ; 1 M NaCl
- Waschpuffer (Puffer G): 10 mM Tris-HCl, pH 7,0;
5 mM CaCl_2 ; 80 mM NaCl
- Elutionspuffer (Puffer H): 10 mM Na-Phosphat, pH 7,0;
0,5 mM CaCl_2 ; 80 mM NaCl

15

Ausbeuteschema:

20

	EPO (μg)	Ausbeute (%)
Ausgang	600	100
Blue-Sepharose	450	75
Hydroxyapatit-Säule	335	55
Aufkonzentrierung	310	52

25

Der Zusatz von 5 mM CaCl_2 in die Puffer C bis G bei Methode 1 führte ebenfalls zu einer besseren Bindung und definierteren Elution von der Hydroxyapatit-Säule.

Alternativ bzw. zusätzlich können für die Aufreinigung von EPO noch folgende Schritte verwendet werden:

30

- RP-HPLC z.B. mit Vydac C4-Material
- DEAE-Sepharose ff Chromatographie
- Diafiltration

Beispiel 2: Aufreinigung von EPO aus Kulturüberständen unter Erhalt der Isoformen 1 - 8 (Vergleich)

1. Ausgangsmaterial

5

EPO aus Säugerzellen, z.B. CHO- oder humanen Zellen, wurde nach einem Repeated-Batch-Verfahren fermentiert. Ein 1000l Fermenter wurde mit einer Vorkultur angeimpft und nach ca. 3 bis 5 Tagen der Fermenterinhalt geerntet. Nach der Ernte wurden die Zellen aus der Fermentationsbrühe durch Abzentrifugieren entfernt. Der zellfreie Kulturüberstand wird mit 1 mol/l Essigsäure auf pH 5.0 - 5.2 eingestellt und bei 1 - 9 °C filtriert.

10

2. Blue-Sepharose-Chromatographie

15

Eine Chromatographiesäule (Amicon P440 x 500, Amicon, GB) wurde mit 60 - 80 l Blue Sepharose gefüllt und mit 0,5 N NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Säule mit ca. 3 Säulenvolumina (SV) Acetatpuffer äquilibriert.

20

Der zellfreie, auf pH 5 eingestellte Kulturüberstand wurde bei einer Temperatur von 10 ± 5 °C und einer Flußrate von 800 - 1400 ml/min auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Flußrate und 5 ± 4 °C mit ca. 1 SV Waschpuffer 1 nachgewaschen. Dann folgten ca. 2 SV Waschpuffer 2. Anschließend wurde die Säule mit ca. 3 SV Elutionspuffer eluiert. Der gesamte Proteinpeak wurde gesammelt (ca. 30 - 60 l), mit HCl auf pH 6.9 eingestellt und bis zur Weiterverarbeitung bei 5 ± 4 °C gelagert. Bei diesem Chromatographieschritt wurde die Produktlösung konzentriert und eine Reinheit von ca. 40 - 50 % erreicht.

25

30

Äquilibrierpuffer: 20 mM Na-Acetat, 5 mM CaCl_2 , 0,1 M NaCl,
pH 5.0 ± 0.2



Waschpuffer 1: 20 mM Na-Acetat, 5 mM CaCl_2 , 0,25 M NaCl,
pH 5.0 ± 0.2

Waschpuffer 2: 20 mM Tris HCl, 5 mM CaCl_2 , pH 6.5 ± 0.3

Elutionspuffer: 100 mM Tris HCl, 5 mM CaCl_2 , 1 M NaCl, pH 9.0 ± 0.2

5

3. Butyl-Toyopearl-Chromatographie (Hydrophobe Chromatographie)

Eine Chromatographiesäule (Pharmacia BPG 300/500) wurde mit 30 - 40 l Butyl-Toyopearl gefüllt und mit 4 M Guanidin-HCl und 0,5 N NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Säule mit mindestens 3 SV Äquibrierpuffer äquilibriert.

Das Eluat der Blue Sepharose-Säule wurde auf 10 % Isopropanol eingestellt und bei einer Temperatur von $27 \pm 2^\circ\text{C}$ und einer Flußrate von 800 - 1200 ml/min auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Temperatur und Flußrate mit ca. 1 SV Äquibrierpuffer und dann mit ca. 2 SV Waschpuffer nachgewaschen. Anschließend wurde sie mit ca. 3 SV Elutionspuffer eluiert. Der gesamte Proteinpeak wird gesammelt (ca. 10 - 18 l), sofort mit Verdünnungspuffer um den Faktor 3 verdünnt und bis zur Weiterverarbeitung bei 15°C gelagert. Bei dieser Chromatographie wurde eine Reinheit von ca. 90 % erreicht.

Äquibrierpuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl_2 , 0,75 M NaCl,
10 % Isopropanol, pH 6.9 ± 0.2

Waschpuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl_2 , 0,75 M NaCl,
19 % Isopropanol, pH 6.9 ± 0.2

Elutionspuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl_2 , 0,75 M NaCl,
27 % Isopropanol, pH 6.9 ± 0.2

Verdünnungspuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl_2 , pH 6.9 ± 0.2

30

4. Hydroxyapatit Ultrogel-Chromatographie

Eine Chromatographiesäule (Amicon P440 x 500 oder Äquivalent) wurde mit 30 - 40 l Hydroxyapatit Ultrogel gepackt und mit 0,5 N NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Säule mit mindestens 4 SV Äquilibratorpuffer
5 äquilibriert.

Das Eluat der Butyl-Toyopearl Säule wurde bei einer Temperatur von ca. 15°C und einer Flußrate von 500 - 1200 ml/min auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Temperatur und Flußrate mit ca. 1 SV Äquili-
10 brierpuffer und dann mit ca. 2 SV Waschpuffer nachgewaschen. Anschließend wurde sie mit ca. 3 SV Elutionspuffer eluiert. Der gesamte Proteinpeak wurde gesammelt (ca. 10 - 18 l) und bis zur Weiterverarbeitung bei 15°C gelagert. Bei dieser Chromatographie wurde eine Reinheit von
15 mehr als 95 % erreicht.

Äquilibratorpuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 0,25 M NaCl, 9 % Isopropanol, pH 6.9 ± 0.2

Waschpuffer: 10 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, pH 6.8 ± 0.2

20 Elutionspuffer: 10 mM Tris-HCl, 10 mM K-Phosphat, 0,5 mM CaCl₂, pH 6.8 ± 0.2

5. Reversed Phase HPLC (RP-HPLC)

25 Eine präparative HPLC wurde mit einer Merck Prepbar 100-Trennanlage (oder Äquivalent) bei einer Temperatur von 22 ± 4 °C durchgeführt. Die Trennsäule (100 mm x 400 mm, 3,2 l) war mit Vydac C4-Material gepackt. Vor dem Einsatz wurde die Säule durch mehrfaches Anlegen eines Gradienten von Puffer A nach 100 % Lösungsmittel regeneriert und anschließend
30 mit Puffer A äquilibriert.

Das Eluat der Hydroxyapatit-Säule wurde mit Trifluoressigsäure auf ca. pH 2.5 angesäuert und sterilfiltriert. Anschließend wurde es bei einer Temperatur von 22 ± 4 °C und einer Flußrate von 250 - 310 ml/min auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Temperatur und Flußrate mit einem linearen Gradient von Puffer A nach Puffer B eluiert. Der Elutionspeak wurde in Fraktionen aufgefangen. Durch Vorlegen von 4 Volumina HPLC-Verdünnungspuffer wurde das Eluat sofort neutralisiert.

Fraktionen, die bei der analytischen HPLC eine Reinheit von mindestens 99 % aufweisen, wurden vereinigt (Poolvolumen ca. 4 - 6 l). Bei dieser Chromatographie wurden Spurenverunreinigungen abgetrennt und eine Reinheit von besser 99 % erreicht.

Puffer A: 0,1 % Trifluoressigsäure in Wasser
Puffer B: 80 % Acetonitril, 0,1 % Trifluoressigsäure in Wasser
HPLC-Verdünnungspuffer: 10 mM Na/K-Phosphat, pH 7.5 ± 0.2

6. DEAE-Sepharose ff Chromatographie

Eine Chromatographiesäule (Amicon P90 x 250 oder Äquivalent) wurde mit 100 - 200 ml Gel pro g EPO im Auftrag gefüllt und mit 0,5 N NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Säule zunächst mit 100 mM Na/K-Phosphatpuffer, pH 7.5 und dann mit mindestens 12 SV Äquilibrierpuffer äquilibriert.

Das Eluat der HPLC-Säule wurde bei einer Temperatur von 5 ± 4 °C und einer Flußrate von ca. 150 ml/min auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Temperatur und Flußrate mit mindestens 5 SV Äquilibrierpuffer und dann mit ca. 10 SV Waschpuffer gewaschen. Anschließend wurde sie erneut mit ca. 10 SV Äquilibrierpuffer gewaschen und dann mit ca. 7 SV Elutionspuffer eluiert. Der gesamte Proteinpeak wurde gesammelt (ca. 2 - 5 l), sterilfiltriert und abgefüllt.

Bei dieser Chromatographie wurde das Lösungsmittel aus dem HPLC-Schritt abgetrennt und Spurenverunreinigungen entfernt. Die Reinheit ist besser 99%.

- 5 Äquilibrierpuffer: 10 mM Na/K-Phosphat, pH 7.5 ± 0.2
Waschpuffer: 30 mM Na-Acetat, pH 4.5 ± 0.1
Elutionspuffer: 10 mM Na/K-Phosphat, 80 mM NaCl pH 7.5 ± 0.2

10 **Beispiel 3: Aufreinigung von EPO aus Kulturüberständen unter Erhalt der Isoformen 1 - 4 (Erfindung)**

1. **Ausgangsmaterial**

15 EPO aus Säugerzellen, z.B. CHO- oder humanen Zellen, wurde nach dem Repeated-Batch-Verfahren fermentiert. Ein 10 l Fermenter wurde mit einer Vorkultur angeimpft und nach ca. 5 Tagen der Fermenterinhalt geerntet. Nach der Ernte wurden die Zellen aus der Fermentationsbrühe durch Abzentrifugieren entfernt. Der zellfreie Kulturüberstand wurde mit 1 mol/l Essigsäure auf pH 5.0 - 5.2 eingestellt und bei 1 - 9 °C filtriert.

20

2. **Blue-Sepharose-Chromatographie**

25 Eine geeignete Chromatographiesäule wurde mit 150 - 250 ml Blue-Sepharose gefüllt und mit 0,5 N NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Säule mit ca. 3 Säulenvolumina (SV) Acetatpuffer äquilibriert.

30 Der zellfreie, auf pH 5 eingestellte Kulturüberstand wurde bei einer Temperatur von 10 ± 5 °C und einer Flußrate von 1 - 2 SV/h auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Flußrate und 5 ± 4 °C mit ca. 1 SV Waschpuffer 1 nachgewaschen. Dann folgten ca. 2 SV Waschpuffer 2. Anschließend wurde die Säule mit ca. 3 - 6 SV Elutionspuffer eluiert. Der Proteinpeak wurde fraktioniert gesammelt. Nach CE-Analytik wurden

geeignete Fraktionen gepoolt, mit HCl auf pH 6.9 eingestellt und bis zur Weiterverarbeitung bei 5 ± 4 °C gelagert. Bei diesem Chromatographieschritt wurde die Produktlösung konzentriert und Verunreinigungen, sowie basische Isoformen abgetrennt.

5

Äquilibrierpuffer: 20 mM Na-Acetat, 5 mM CaCl_2 , 0,1 M NaCl, pH 5.0 ± 0.2

Waschpuffer 1: 20 mM Na-Acetat, 5 mM CaCl_2 , 0,25 M NaCl, pH 5.0 ± 0.2

10

Waschpuffer 2: 20 mM Tris HCl, 5 mM CaCl_2 , pH 6.5 ± 0.3

Elutionspuffer: 50 mM Tris HCl, 5 mM CaCl_2 , 0,25 M NaCl, pH 8.0 ± 0.2

3. Butyl-Toyopearl-Chromatographie (hydrophobe Chromatographie)

15

Eine geeignete Chromatographiesäule wurde mit 200 - 300 ml Butyl-Toyopearl gefüllt und mit 4 M Guanidin-HCl und 0,5 N NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Säule mit mindestens 3 SV Äquilibrierpuffer äquilibriert.

20

Das Eluat der Blue Sepharose-Säule wurde auf 10 % Isopropanol eingestellt und bei einer Temperatur von 27 ± 2 °C und einer Flußrate von 1 - 2 SV/h auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Temperatur und Flußrate mit ca. 1 SV Äquilibrierpuffer und dann mit ca. 2 SV Waschpuffer nachgewaschen. Anschließend wurde sie mit ca. 5 - 10 SV Elutionspuffer eluiert. Von dem Proteinpeak wurden Fraktionen gesammelt und sofort mit Verdünnungspuffer um den Faktor 3 verdünnt. Nach CE-Analytik wurden geeignete Fraktionen gepoolt und bis zur Weiterverarbeitung bei 15°C gelagert. Bei dieser Chromatographie wurden weitere basische Isoformen abgetrennt und eine Reinheit von > 80 % erreicht.

30

- Äquilibratorpuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl_2 , 0,2 M NaCl, 10 %
Isopropanol, pH 6.9 ± 0.2
- Waschpuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl_2 , 0,2 M NaCl, 17 %
Isopropanol, pH 6.9 ± 0.2
- 5 Elutionspuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl_2 , 0,2 M NaCl,
23 % Isopropanol, pH 6.9 ± 0.2
- Verdünnungspuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl_2 , pH 6.9 ± 0.2

4. Hydroxyapatit Ultrogel-Chromatographie

10

Eine geeignete Chromatographiesäule wurde mit 150 - 200 ml Hydroxyapatit Ultrogel gepackt und mit 0,5 N NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Säule mit mindestens 4 SV Äquilibratorpuffer äquilibriert.

- 15 Das Eluat der Butyl-Toyopearl Säule wurde bei einer Temperatur von ca. 15°C und einer Flußrate von 1 - 2 SV/h auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Temperatur und Flußrate mit ca. 1 SV Äquilibratorpuffer und dann mit ca. 2 SV Waschpuffer nachgewaschen. Anschließend wurde sie mit ca. 3 SV Elutionspuffer eluiert. Der gesamte Proteinpeak wurde
- 20 gesammelt und bis zur Weiterverarbeitung bei 15°C gelagert. Bei dieser Chromatographie wurde eine Reinheit von besser 95 % erreicht.

- Äquilibratorpuffer: 20 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl_2 , 0,06 M NaCl, 7,5 %
Isopropanol, pH 6.9 ± 0.2
- 25 Waschpuffer: 10 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl_2 , pH 6.8 ± 0.2
- Elutionspuffer: 10 mM Tris-HCl, 10 mM K-Phosphat, 0,5 mM CaCl_2 ,
pH 6.8 ± 0.2

5. Reversed Phase HPLC (RP-HPLC)

30

Eine semipräparative HPLC wurde mit einer Vydac C4 - Trennsäule (20 mm x 250 mm, ca. 80 ml) bei einer Temperatur von $22 \pm 4^\circ\text{C}$ durchgeführt.

Vor dem Einsatz wurde die Säule durch mehrfaches Anlegen eines Gradienten von Puffer A nach 100 % Lösungsmittel regeneriert und anschließend mit Puffer A äquilibriert.

- 5 Das Eluat der Hydroxyapatit-Säule wurde bei einer Temperatur von $22 \pm 4^\circ\text{C}$ und einer Flußrate von 8 - 15 ml/min auf die Säule aufgezogen. Die Säule wurde bei gleicher Temperatur und Flußrate mit einem linearen Gradienten von Puffer A nach Puffer B gemäß folgendem HPLC-Protokoll eluiert. Der Elutionspeak wurde in Fraktionen aufgefangen. Durch Vorlegen
10 von 4 Volumina HPLC-Verdünnungspuffer wurde das Eluat sofort verdünnt.

HPLC-Protokoll:

Zeit (min)	Schritt	% Puffer A (v/v)	% Puffer B (v/v)
	Start		
15 0,0		100	0
	Wasch 1		
10,0		100	0
	Wasch 2		
20,0		50	50
20	Wasch 3 und Elution (*)		
160,0		0	100
	Nachwasch		
170,0		0	100
	Zurückstellen auf Ausgangsbedingungen		
25 171,0		100	0

(*) Wasch 3 und Elutionsbedingungen: Gradient von 50% Puffer B nach 100% Puffer B in 50 bis 200 min, bevorzugt 140 min.

- 30 Fraktionen, die bei der analytischen HPLC eine Reinheit von mindestens 99% aufweisen und nach CE-Analytik geeignet sind, wurden vereinigt. Bei

dieser Chromatographie wurden Spurenverunreinigungen sowie Reste basischer Isoformen abgetrennt und eine Reinheit von besser 99 % erreicht.

Puffer A: 10 mM Na/K-Phosphat, pH 7.0 ± 0.2

5 Puffer B: 10 mM Na/K-Phosphat, 80 % Acetonitril, pH 7.0 ± 0.2

HPLC-Verdünnungspuffer: 10 mM Na/K-Phosphat, 100 mM NaCl,
pH 7.5 ± 0.2

10 6. Diafiltration

Eine Diafiltrationsapparatur geeigneter Größe wurde mit einer 10 kD Kassette bestückt und mit 1 N NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Apparatur mit Bulkpuffer laugefrei gespült.

15

Das Eluat der HPLC-Säule wurde bei einer Temperatur von 5 ± 4 °C konzentriert und gegen 10 Volumina an Bulkpuffer diafiltriert. Die Endkonzentration sollte zwischen 1 - 3 mg/ml betragen.

20 Dieser Schritt dient zur Entfernung von Lösungsmittelresten aus dem HPLC-Schritt, zur Einstellung der erforderlichen Bulkpufferbedingungen und Produktkonzentration des Bulk-Wirkstoffs.

Bulkpuffer: 10 mM Na/K-Phosphat, 100 mM NaCl, pH 7.5 ± 0.2

25

Beispiel 4 Bestimmung der spezifischen Aktivität von EPO in vivo
(Bioassay an der normozythämischen Maus)

Die dosisabhängige Aktivität von EPO auf die Vermehrung und Differenzierung von Erythrozyten-Vorläuferzellen wurde in vivo in Mäusen über den
5 Anstieg der Reticulocyten im Blut nach EPO-Gabe bestimmt.

Hierzu wurden jeweils acht Mäusen verschiedene Dosen der zu analysierenden EPO-Probe und eines EPO-Standards (abgeglichen gegen den EPO-
10 WHO-Standard) parenteral verabreicht. Die Mäuse wurden anschließend unter konstanten definierten Bedingungen gehalten. 4 Tage nach EPO-Gabe wurde den Mäusen Blut entnommen und die Reticulocyten mit Acridinorange angefärbt. Die Bestimmung der Reticulocytenzahl pro 30 000 Erythrocyten erfolgte mikrofluorimetrisch im Durchflußcytometer durch
15 Analyse des Rotfluoreszenz-Histogramms.

Die Berechnung der biologischen Aktivität erfolgte aus den Werten für die Reticulocytenzahlen der Probe und des Standards bei unterschiedlichen Dosen nach dem von Linder beschriebenen Verfahren der paarweisen
20 Gehaltsbestimmung mit parallelen Geraden (Linder, Planen und Auswerten von Versuchen, 3. Auflage, 1969, Birkenhäuser Verlag, Basel).

Bei der Aufreinigung von EPO aus Kulturüberständen von in serumfreiem Medium kultivierten CHO-Zellen wurden die EPO-Präparate CHO 1, CHO 2
25 bzw. CHO 3 erhalten, welche eine biologische Aktivität von 248 000 (CHO 1), 225 000 (CHO 2) bzw. 186 000 IU/mg (CHO 3) hatten. In vier Ansätzen, bei denen EPO aus Kulturüberständen von humanen Zellen aufgereinigt wurde, erhielt man Produkte mit spezifischen Aktivitäten von 220 000 (HeLa 1), 198 000 (HeLa 2), 204 000 (HeLa 3), 176 000 (HeLa 4) bzw.

100 000 IU/mg (HeLa 5). Die Korrelation der Werte für die biologische Aktivität mit Parametern der Zuckerstruktur ist in Beispiel 11 angegeben.

Beispiel 5 Bestimmung des Gehalts an Sialinsäureresten

5

Die Bestimmung des Sialinsäuregehaltes erfolgte chromatographisch über HPAEC-PAD (High pH Anion Exchange Chromatography mit Pulsed Amperometric Detection) auf einem Dionex System nach enzymatischer Abspaltung der Sialinsäuren mit Neuraminidase aus *Arthrobacter ureafaciens* (A. ureaf., Boehringer Mannheim).

10

Ansätze mit je 22 µg EPO aus verschiedenen Präparationen aus CHO- und humanen Zelllinien (z.B. HeLa S3) wurden auf eine EPO-Konzentration von 0,2 mg/ml in 5 mM Na-Phosphat-Puffer, pH 7,2 eingestellt. Je eine Hälfte jedes Ansatzes wurde für die genaue Bestimmung der EPO Menge über RP-HPLC verwendet. Zur 2. Hälfte der Ansätze wurden je 5 mM U Neuraminidase von A. ureaf. gegeben und über Nacht (ca. 18 h) bei 37°C inkubiert. Anschließend wurden die Verdauansätze halbiert, 20-fach auf 500 µl mit H₂O verdünnt und 50 µl davon (entspricht ca. 27 pmol EPO) auf das Dionex System aufgetragen. Hierzu wurden folgende Chromatographie-Parameter verwendet:

15

20

Säule: CarboPac PA 100

Fluß: 1,0 ml/min

25 Detektorempfindlichkeit: 300 nA

- 31 -

Gradient:	t (min)	% Puffer B
	0	17
	7	17
	9	100
5	12	100
	13	0
	20	0

Puffer A: 0,1 M NaOH

Puffer B: 0,1 M NaOH; 0,5 M Na-Acetat

10

Die Menge an Sialinsäuren in der aufgetragenen Probe wurde mit Hilfe einer Eichgerade, die aus Werten eines mitgeführten Sialinsäurestandards (Boehringer Mannheim) erhalten wurde, ermittelt. Der Sialinsäuregehalt (mol Sialinsäure/mol EPO) wurde aus dem Ergebnis der Sialinsäurebestimmung (Dionex System) und der Bestimmung der eingesetzten EPO-Menge über RP-HPLC berechnet.

15

Das EPO aus CHO-Zellen hatte einen mittleren Gehalt von 12,9 mol (CHO 1), 11,8 (CHO 2) bzw. 11,7 mol (CHO 3) Sialinsäure pro mol EPO. Die aus humanen Zellen stammenden EPO-Präparationen hatten einen Anteil von 13,1 mol (HeLa 1), 13,2 mol (HeLa 2), 13,3 mol (HeLa 3), 11,6 mol (HeLa 4) bzw. 10,8 mol (HeLa 5) Sialinsäure pro mol EPO (vgl. auch Beispiel 11).

20

Beispiel 6**Bestimmung der Anteile an bi-, tri- und tetraantennären Kohlenhydratstrukturen**

Die Analytik der N-gebundenen Kohlenhydratstrukturen erfolgte chromatographisch über HPAEC-PAD auf einem Dionex System. Die asialo Oligosaccharide von EPO-Präparationen aus CHO- und humanen Zelllinien (z.B. HeLa S3) wurden durch enzymatische Abspaltung mit N-Glycosidase F (Boehringer Mannheim) und Neuraminidase aus A.ureaf. (Boehringer Mannheim) gewonnen.

10 10 bzw. 30 µg EPO je Ansatz wurden mittels MicroCon-Ultrazentrifugationseinheiten (Amicon, Ausschlußgröße 10 kD) entsalzt und mit 10 mM Na-Phosphat-Puffer, pH 7,2 auf eine Konzentration von 0,2 bzw. 0,3 mg/ml eingestellt. Anschließend wurde jeder Ansatz mit 1 U N-Glycosidase F und
15 10 mU Neuraminidase versetzt und über Nacht (ca 18 h) bei 37°C inkubiert. Zur Abtrennung des EPO-Polypeptidanteils von den abgespaltenen Oligosacchariden wurden die Ansätze nach der Inkubation durch Ultrafree-Zentrifugationseinheiten (Millipore, Ausschlußgröße 10 kD) zentrifugiert und das Ultrafree-Device zweimal mit 20 µl H₂O nachgewaschen. Die im Durchlauf
20 enthaltenen Oligosaccharide wurden mit H₂O auf 150 µl aufgefüllt und 100 µl davon auf dem Dionex System analysiert. Hierzu wurden folgende Chromatographie-Parameter verwendet:

25 Säule:	CarboPac PA 100
Fluß:	1,0 ml/min
Detektorempfindlichkeit:	300 nA

- 33 -

Gradient:	t (min)		% Puffer B	
		0		0
		2		0
		60		10
5		62		100
		67		100
		t (min)		% Puffer B
		69		0
10		80		0

Puffer A: 0,1 M NaOH

Puffer B: 0,1 M NaOH; 0,5 M Na-Acetat

15 Die Identifikation der Peaks in einem Chromatogramm von N-Zuckern des komplexen Typs erfolgte durch Standard-Oligosaccharide (Oxford Glyco Systems) und wurde durch den enzymatischen Verdau der Oligosaccharide von EPO mit dem Enzym Endo- β -Galactosidase bzw. Fucosidase und anschließender Analytik auf dem Dionex System verifiziert. Die Berechnung

20 der prozentualen Anteile an bi-, tri- und tetraantennären Strukturen erfolgte über die Flächen der Peaks, die die entsprechende N-Zuckerstruktur repräsentieren, bezogen auf die Gesamtpeakfläche (Summe der Peakflächen von bi-, tri- und tetraantennären Strukturen).

25 Das aus CHO-Zellen stammende EPO hatte einen Anteil von 4,2% biantennären Kohlenhydratstrukturen, 22,3% triantennären Kohlenhydratstrukturen und 73,5% tetraantennären Kohlenhydratstrukturen (CHO3) bzw.

einen Anteil von 86,7% tetraantennären Kohlenhydratstrukturen in Präparat CHO 1 und 78,6% in CHO 2. Bei den Präparationen von EPO aus humanen Zelllinien wurden Anteile an biantennären/triantennären/tetraantennären Strukturen für HeLa 1 von 5,8/8,8/85,4 %, für HeLa 2 von 5,1/12,7/82,2%, für HeLa 3 von 4,1/17,7/78,2%, für HeLa 4 von 10,1/19,2/70,6% und für HeLa 5 von 12,6/25,4/62% erhalten (vgl. auch Beispiel 11).

Beispiel 7 Bestimmung des mittleren Gehalts an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten und des mittleren Anteils an zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten (Repeats)

Die Gesamtzahl an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten in den N-gebundenen Kohlenhydratstrukturen von EPO (d.h. in den Core-Kohlenhydratstrukturen plus Repeats) wurde aus den Peakflächen der Chromatogramme der Experimente von Beispiel 6 berechnet.

Die Berechnung der Anzahl des mittleren Gehalts (n) von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten pro Kohlenhydratkette war wie folgt.

$$n = \frac{\sum \% (bi) \times 2 + \% (tri) \times 3 + \% (tetra) \times 4 + \% (tri + 1r) \times 4 + \% (tetra + 1r) \times 5 + \% (tri + 2r) \times 5 + \% (tetra + 2r) \times 6}{100}$$

wobei

% (bi) = prozentualer Anteil biantennärer Strukturen bezogen auf die Gesamtmenge (100%) von N-gebundenen Kohlenhydratstrukturen

% (tri) = prozentualer Anteil triantennärer Strukturen ohne zusätzliche N-Acetyl-Lactosamin-Einheit

	% (tetra) =	prozentualer Anteil tetraantennärer Strukturen ohne zusätzliche N-Acetyl-Lactosamin-Einheit
	% (tri + 1r) =	prozentualer Anteil triantennärer Strukturen mit 1 zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheit
5	% (tetra + 1r) =	prozentualer Anteil tetraantennärer Strukturen mit 1 zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheit
	% (tri + 2r) =	prozentualer Anteil triantennärer Strukturen mit 2 zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten
10	% (tetra + 2r) =	prozentualer Anteil tetraantennärer Strukturen mit 2 zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten.

Bei EPO aus CHO-Zellen wurde eine mittlere Anzahl von 4,3 (CHO 1), 4,4 (CHO 2) bzw. 4,2 (CHO 3) N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten pro Kohlenhydratkette gefunden. Bei den EPO-Präparationen aus humanen Zellen wurde
15 eine Anzahl an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten von 4,0 (HeLa 1), 4,0 (HeLa 2), 3,9 (HeLa 3), 3,75 (HeLa 4) bzw. 3,6 (HeLa 5) gefunden (vgl. auch Beispiel 11).

Aufgrund der Tatsache, daß EPO 3 N-gebundene Zuckerstrukturen enthält,
20 ist die Gesamtzahl an N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten um das 3-fache größer. Bezogen auf die Gesamtglycosilierung von EPO beträgt die Anzahl der N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bei EPO aus CHO-Zellen deshalb 12,9 (CHO 1), 13,2 (CHO 2) bzw. 12,6 (CHO 3). Bei den EPO-Präparaten aus humanen Zellen waren die entsprechenden Werte 12,0 (HeLa 1), 11,9
25 (HeLa 2), 11,7 (HeLa 3), 11,25 (HeLa 4) und 10,8 (HeLa 5).

Das Produkt aus Anzahl der N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten pro Kohlenhydratstruktur multipliziert mit dem jeweiligen Sialinsäuregehalt ergab bei EPO aus CHO-Zellen Werte von 55,5 (CHO 1), 52 (CHO 2) bzw. 49,3 (CHO 3).

Bei den EPO-Präparaten aus humanen Zellen waren die entsprechenden Werte 52,4 (HeLa 1), 52,5 (HeLa 2), 51,3 (HeLa 3), 43,5 (HeLa 4) und 38,9 (HeLa 5).

- 5 Bezogen auf die Gesamtglycosilierung von EPO (3 N-gebundene Kohlenhydratstrukturen) beträgt das Produkt aus Anzahl der N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten, multipliziert mit dem jeweiligen Sialinsäuregehalt bei EPO aus CHO-Zellen 166,5 (CHO 1), 156 (CHO 2) bzw. 147,9 (CHO 3). Bei den EPO-Präparaten aus humanen Zellen waren die entsprechenden Werte 157,2
10 (HeLa 1), 157,5 (HeLa 2), 153,9 (HeLa 3), 130,5 (HeLa 4) und 116,7 (HeLa 5), vgl. auch Beispiel 11.

Ein weiterer wichtiger Parameter ist der Anteil von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten die als sogenannte Repeats an die Core-Kohlenhydratstrukturen gebunden sein können (vgl. z.B. Fig. 1). Der Repeatgehalt wird als prozentualer Anteil der repeathaltigen Kohlenhydratstrukturen bezogen auf die
15 Summe aller N-gebundenen Kohlenhydratstrukturen (bi + tri + tetra = 100%) angegeben.

- 20 Dieser Anteil von Repeats kann bei EPO-Präparaten aus CHO-Zellen und aus humanen Zellen unterschiedlich sein. So wurden für die Präparate aus CHO-Zellen Repeatsanteile von 39,6% (CHO 1), 51% (CHO 2) bzw. 36,8% (CHO 3). Für die Präparate aus humanen Zellen wurden die Repeatanteile von 18% (HeLa 1), 16,5% (HeLa 2), 14,0% (HeLa 3), 12,2% (HeLa 4) und
25 9,8% (HeLa 5) bestimmt (vgl. Beispiel 11).

**Beispiel 8: Beeinflussung der biologischen Aktivität von EPO
durch kontrollierte und bedarfsgerechte Zufütterung**

Die Kultivierungen wurden als wiederholt satzweiser Betrieb mit
5 bedarfsgerechter Zufütterung (Repeated Fed Batch) bei einer Temperatur
von 36,5 °C durchgeführt. Dazu wurde in einem gerührten Fermenter
(Gesamtarbeitsvolumen: 10 L) serumfreies proteinarmes Kulturmedium
vorgelegt und einmalig mit einer Inokulumkultur beimpft. Die Zelldichte
nach Beimpfen lag im Bereich $3 \pm 1 \times 10^5$ lebende Zellen/ml.

10

Nach einer Wachstumsphase von 144 ± 24 Stunden wurde ein Teil der
Kulturbrühe geerntet. Der Rest der Kulturbrühe verblieb im Fermenter und
stellte das Inokulum für die nächste Wachstumsphase dar; dazu wurde..
der Fermenter wieder bis zum Arbeitsvolumen mit frischem Medium
15 aufgefüllt.

Der EPO-haltige Kulturüberstand wurde durch Zentrifugation der
Fermentationskultur erhalten.

20 Während der Wachstumsphase wurde der Kultur kontinuierlich Nähr-
stofflösung zugeführt. Dazu wurde ein Vorratsgefäß mit Nährlösung an
den Fermenter gekoppelt. Die Nährstofflösung enthielt Aminosäuren,
Vitamine, Insulin, Spurenelemente, Salze, Glutamin und Kohlenhydrate.
Es wurden 2 Fermentationen wie folgt durchgeführt:

25

Bei der Fermentation A enthielt die Nährstofflösung als Zucker D-(+)-
Glucose und bei der Fermentation B die Zucker D-(+)-Glucose, D-(+)-
Galactose und D-(+)-Mannose. Das Masseverhältnis von Glutamin zu

den Zuckern betrug bei Fermentation B 1:2,2:3,6:6. Die Konzentration der einzelnen Zucker in der Nährstofflösung lag zwischen 7,2 und 18 g/l.

- Die Glutaminkonzentration in der Kultur wurde bei Fermentation B periodisch analysiert und der Verbrauch berechnet. Der momentane Volumenstrom der Nährstofflösung wurde dem Bedarf der Zellen an Nährstoffen angepaßt. Bei Fermentation A wurde die Glutaminkonzentration nicht als Regelgröße verwendet. Die Nährstofflösung bei der Fermentation B enthielt eine Mischung der Zucker D-(+)Glucose, D-(+)Galactose und D-(+)Mannose im Massenverhältnis von 2:3:5. Während der Kultivierung wurde durch entsprechende Zufütterung die Konzentration aller Zucker im Fermenter in einem Bereich von 2 bis 6 g/l gehalten.
- Die Zelldichte veränderte sich durch das Wachstum auf mehr als 20×10^5 Zellen/ml, typischerweise $30 \pm 10 \times 10^5$ Zellen/ml zum Erntezeitpunkt. Die Konzentration an EPO betrug zum Erntezeitpunkt typischerweise 40 ± 10 mg/l.
- Aus geernteten Kulturbrühen wurde die Konzentration an humanem Erythropoietin z.B. durch ELISA bestimmt. Eine prozentuale Verteilung der auftretenden Isoformen dieses Proteins wurden z.B. durch Trennung mittels Kapillaronenelektrophorese (CZE) bestimmt.
- Tabelle 1 zeigt den Vergleich der EPO-Isoformenverteilung zwischen einer Fermentation A mit Zufütterung einer Nährstofflösung mit Glucose und einer Fermentation B mit kontrollierter und bedarfsgerechter Zufütterung einer Nährstofflösung mit Glucose, Mannose und Galactose. Der Anteil der EPO-Isoformen bei Fermentation B wurde als prozentualer Anteil der korrespondierenden Isoformen der Fermentation A berechnet. Letztere

wurden auf jeweils 100% normiert. Die Daten belegen, daß die erwünschten höher glykosilierten EPO-Isoformen 2-4 während der Fermentation gegenüber der Fermentation A in maßgeblich höheren Anteil vorliegen.

5

Tabelle 1:

	Isoformbezeichnung in der CZE	1	2	3	4	5	6	7	8
10		[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
	Fermentation A: Zufütterung mit Glucose	n.b.	100	100	100	100	100	100	100
15	Fermentation B: bedarfsgerechte Zufütterung mit Glucose, Mannose und Galactose	n.b.	136	140	115	102	91	76	55

20 n.b.= nicht bestimmbar, da Wert unter Nachweisgrenze

Das bei Zufütterung erhaltene Isoformenmuster war bei vier aufeinanderfolgenden Ernten aus einer Fermentation mit kontrollierter und bedarfsgerechter Zufütterung der Nährstofflösung reproduzierbar.

25

Beispiel 9: Beeinflussung der biologischen Aktivität von EPO durch Veränderung der Kultivierungstemperatur

Die Durchführung erfolgte wie in Beispiel 8 (Fermentation B) beschrieben im Fed-Splitbatch-Verfahren mit kontrollierter und bedarfsgerechter Zufütterung, außer daß die Fermentertemperatur 35,0 °C anstelle von 36,5 °C betrug und die Fermentation im 1000 l Maßstab durchgeführt wurde.

30

Tabelle 2 zeigt den Vergleich der EPO-Isoformenverteilung zwischen einer Fermentation C bei 36,5 °C und einer Fermentation D bei 35,0 °C jeweils mit kontrollierter Zufütterung einer Nährstofflösung. Der Anteil der EPO-Isoformen bei Fermentation D wurde als prozentualer Anteil der korrespondierenden Isoformen der Fermentation C berechnet. Letztere wurden auf jeweils 100 % normiert. Die Daten belegen, daß die sauren EPO-Isoformen 2 bis 4 durch Absenkung der Temperatur maßgeblich angehoben werden.

Tabelle 2:

Isoformbezeichnung in der CZE	1	2	3	4	5	6	7	8
Relative Isoformenverteilung	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
Fermentation C: Temperatur 36,5 °C:	n.b.	100	100	100	100	100	100	100
Fermentation D: Temperatur 35,0 °C:	n.b.	131	116	110	94	100	88	86

n.b.= nicht bestimmbar, da Wert unter Nachweisgrenze

Beispiel 10: Beeinflussung der biologischen Aktivität von EPO durch Veränderung der Kohlenhydratzusammensetzung im Medium

Das im folgenden dargelegte Verfahren belegt die Möglichkeit, die Qualität von humanem Erythropoietin durch Veränderung des Kohlenhydratangebotes im Zufütterungsmedium zu verändern.

Es werden zwei Varianten des oben beschriebenen Verfahrens gezeigt (nachfolgend Fermentation E und Fermentation F genannt), die sich durch die Zusammensetzung der verwendeten Medien unterscheiden.

Für beide Ansätze basierte die Rezeptur des Kulturmediums auf modifiziertem eRDF-Medium. Es wurde kein Serum eingesetzt, sondern rekombinantes Insulin (einziger Proteinzusatz) und weitere Supplemente (z.B. Selenit, Putrescin, Hydrocortison, Eisensulfat), die üblicherweise bei serumfreien bzw. proteinfreien Medien eingesetzt werden.

Die Zufütterungs-Nährlösung basiert ebenfalls auf modifiziertem eRDF-Medium, enthält jedoch nicht die Salze KCl, Na_2HPO_4 und NaCl.

Der maßgebliche Unterschied der Fermentationen E und F liegt im Zusatz von verschiedenen Monosacchariden zum Zufütterungsmedium.

Fermentation E:

Es wurde für Fermentation E der üblicherweise eingesetzte Zucker D-(+)-Glucose verwendet. Die Startkonzentration betrug 3 g/l. Durch eine geeignete Zufütterung der glucosehaltigen Nährlösung wurde die Glucosekonzentration in der Kulturbrühe bei $3 \pm 0,5$ g/l während der gesamten Kultivierung konstant gehalten.

20

Die Kultivierungsdauer lag typischerweise bei 100 ± 20 h. Die Konzentration an EPO betrug zum Erntezeitpunkt typischerweise 40 ± 10 mg/l.

Fermentation F:

25

Für die Fermentation F wurden zusätzlich zu D-(+)-Glucose die Zucker D-(+)-Galactose und D-(+)-Mannose im Masseverhältnis von ca. 1:2:3 für das Zufütterungsmedium eingesetzt. Während der Kultivierung wurde durch

entsprechende Zufütterung die Konzentration aller Zucker in einem Bereich zwischen 0,25 g/l und 3,5 g/l gehalten.

5 Die Kultivierungsdauer für diese Wachstum lag typischerweise bei 100 ± 20 Stunden. Die Konzentration an EPO betrug zum Erntezeitpunkt typischerweise 40 ± 10 mg/l.

10 Erythropoietin wurde aus den Kulturüberständen aufgereinigt. Das durchgeführte Aufreinigungsverfahren war so ausgelegt (siehe Beispiel 2), daß die Verteilung von relevanten Isoformen des Glykoproteins nicht beeinflußt wurde.

Die Isoformenverteilung des gereinigten Erythropoietin wurde wie zuvor beschrieben bestimmt.

15

Die Kohlenhydratstrukturen der Isoformen von humanem Erythropoietin und ihre Verteilung unterscheiden sich in den geernteten Kulturüberständen von Fermentation E zu Fermentation F. Die Fermentation E zeigt einen deutlich höheren Anteil der Isoformen 2, 3 und 4 gegenüber Fermentation F. Diese
20 Unterschiede werden durch eine Zufütterung der Monosaccharide Mannose und Galactose bewirkt (vgl. Fig. 2).

Die biologische Aktivität, bestimmt durch den Normo-Maus-Test (Beispiel 4), korreliert mit der Verteilung und den Kohlenhydratstrukturen der EPO-Isoformen (Fig. 3). Die Kohlenhydratstrukturen der aus den Kulturüberständen E und F erhaltenen EPO-Präparationen wurden mit CZE- und
25 HPAEC-Analytik untersucht.

In Tabelle 3 sind die Antennärität (Gehalt an Bi- Tri- und Tetrastrukturen), der Gehalt an N-Acetyl-Lactosamineinheiten (LE), der Sialinsäuregehalt (SA) und das Produkt aus LE und SA der beiden EPO-Präparationen dargestellt.

5 Tabelle 3

	bi [%]	tri [%]	tetra [%]	SA- Gehalt	LE- Gehalt	LExSA
Fermentation E	12,6	25,4	62,0	10,8	10,8	116,7
10 Fermentation F	10,1	19,2	70,6	11,6	11,25	130,5

Beispiel 11: Korrelation der spezifischen Aktivität und Kohlenhydratstrukturen

15 In diesem Beispiel sind Untersuchungen zur Abhängigkeit der biologischen Aktivität einzelner EPO-Isoformen von den Kohlenhydratstrukturen zusammengefaßt. Dabei wurden Isoformen (IF) aus verschiedenen EPO-Quellen (verschiedene Chargen von EPO aus CHO-Zellen und humanen Zellen) isoliert und verglichen.

11.1 Isolierung individueller Isoformen von EPO mittels isoelektrischer Fokussierung (IEF) und Western Blot

A) Durchführung der IEF-Gelelektrophorese und ElektrobloTTing auf Nitrozellulose

5 Zur Isolierung einzelner Isoformen in reiner Form wurde eine EPO-Lösung bestehend aus einem Gemisch mehrerer Isoformen in Ultrafree-Zentrifugationseinheiten entsalzt und aufkonzentriert (5-10 mg/ml). 350-1000 μ g
10 dieser Lösung wurden auf ein IEF-Polyacrylamid-Fertiggel von Serva (Servalyt Precotes, pH 3-5, 300 μ m, 125 x 125 mm) aufgetragen (in 5-10 Bahnen mit 70-100 μ g EPO pro Bahn). Die IEF wurde bei 2500 V für 3,5 h bei 5°C durchgeführt; anschließend wurde das Gel auf Nitrozellulose
15 geblottet (Naßblot in Tris/Glycin-Puffer mit Methanol, aber ohne SDS für 3 h bei 200 mA). Nach dem Blotvorgang wurde das Gel entfernt und die Nitrozellulosemembran mit Ponceau S angefärbt. Die gefärbten Isoformen wurden ausgeschnitten und mit H₂O oder TBS-Puffer (100 mM Tris, pH 7,4; 150 mM NaCl) wieder vollständig entfärbt.

20 B) Extraktion der Isoformen von der Membran

Die entfärbten Nitrozellulosestreifen mit den jeweils entsprechenden Isoformen wurden in 2 ml Eppendorfgefäße gegeben (entsprechend 3-4 Bahnen des IEF-Gels), 1,5 ml Aceton zugegeben und die Nitrozellulose
25 durch Vortexen gelöst. Zur optimalen Ausfällung des EPO wurde über Nacht bei -20°C inkubiert. Anschließend wurde das EPO-haltige Präzipitat für 10 min in einer Tischzentrifuge bei 14000 Upm isoliert. Der Niederschlag wurde 2-3 mal mit 1 ml Aceton gewaschen und danach bei Raumtemperatur oder 37°C unter Stickstoffstrom getrocknet. Das EPO-Präzipitat wurde anschlie-

ßend in 20 mM Na-Phosphat-Puffer, pH 7,2 mit 0,01% Tween 20 gelöst und bis zur weiteren Analyse bei -20°C gelagert.

C) Isolierung von Isoformen aus vorfraktionierten EPO-Lösungen

5

Die Isolierung einzelner Isoformen wurde wie in A) und B) beschrieben durchgeführt, mit der Einschränkung, daß die verwendeten EPO-Ausgangslösungen nicht 7-8, sondern nur 3-4 Isoformen enthielten. Ausgangsmaterial waren EPO-Fraktionen, die durch eine DE-Chromatographie (Anionenaustauscher) gewonnen wurden. Diese Fraktionen enthielten nur 3-4 Isoformen (z.B. Isoform 6-8 oder Isoform 1-4). Für die Isolierung der "Isoformenpakete" wurde eine geeignete Chromatographiesäule mit 1-2 ml DEAE-Sepharose ff pro 10 mg EPO im Auftrag gefüllt und mit 0,5 M NaOH regeneriert. Anschließend wurde die Säule zunächst mit 2 SV Neutralisierungspuffer und dann mit mindestens 5 SV Äquibrierpuffer äquibriert.

15

Eine gereinigte EPO-Präparation bestehend aus 8 Isoformen wurde bei einer Temperatur von $5 \pm 4^\circ\text{C}$ und einer Flußrate von bis zu 15 SV/h aufgezogen. Die Säule wurde dann mit 2 bis 3 SV Äquibrierpuffer gewaschen und anschließend solange mit Waschpuffer gespült, bis der pH-Wert bei 5,0 lag (ca. 5 SV).

20

Die Elution von verschiedenen Isoformenpaketen wurde durch Erhöhung der NaCl-Konzentration im Elutionspuffer in 10 mM-Stufen beginnend bei 20 mM NaCl erreicht. Die basischen Isoformen binden schwächer an den Ionenaustauscher und eluieren entsprechend bei niedrigen Ionenstärken, die sauren Isoformen eluieren bei höheren NaCl-Konzentrationen bis 70 mM NaCl. Die Menge der bei einer bestimmten NaCl-Konzentration eluierten Isoformen hängt stark vom Ausgangsmaterial und dem Elutionsvolumen ab.

25

30

Auf den einzelnen Stufen wurde in der Regel so lange eluiert, bis die OD280 auf etwa 50% des Maximalwertes bei dieser NaCl-Konzentration abgesunken war. Dies entsprach zwischen 15 und 40 SV. Durch zusätzliche Fraktionierung der eluierten Isoformenpakete innerhalb einer NaCl-Konzentration wurde eine weitere Auftrennung der Isoformen erreicht. Die Laufgeschwindigkeit der Säule betrug bis zu 15 SV/h.

Neutralisationspuffer:	100 mM Na/K-Phosphat, pH 7,5 ± 0,2
Äquilibrierpuffer:	10 mM Na/K-Phosphat, pH 7,5 ± 0,2
Waschpuffer:	30 mM NaAc/HAc, pH 5,0 ± 0,2
Elutionspuffer:	10 mM NaAc/HAc, pH 5,0 ± 0,2, 20 mM NaCl, bzw. Erhöhung der Konzentration in 10 mM Schritten bis 70 mM NaCl

Aus den so erhaltenen Isoformenpaketen wurden einzelne, reine Isoformen durch Aufreinigung wie in A) und B) beschrieben gewonnen.

Die Nummerierung der aus A-C gewonnenen reinen Isoformen (IF) wurde entsprechend ihres isoelektrischen Punktes (pI) von sauer nach basisch vorgenommen. Isoform 2 (IF2) ist die am stärksten saure isolierte Isoform mit dem niedrigsten pI, Isoform 8 ist die am stärksten basische mit dem höchsten pI. Isoform 2 war die Isoform mit dem niedrigsten pI, die in ausreichenden Mengen aus dem Ausgangsgemisch isoliert werden konnte. Isoform 1 war nur zu 1-2% im Ausgangsgemisch enthalten, so daß für eine vollständige Analyse keine ausreichenden Mengen gewonnen werden konnten.

Es wurden folgende Analysen zur Charakterisierung der reinen Isoformen durchgeführt:

- Bestimmung der Menge und der Ausbeute mittels RP-HPLC
- Bestimmung der Reinheit und Identität durch Kapillarelektrophorese
und Isoelektrische Fokussierung

Die Ausbeute an individuellen Isoformen betrug im allgemeinen zwischen 20% und 30% der im Ausgangsgemisch eingesetzten Isoform.

Die Reinheit der Isoformen war in der Regel > 90%, meist sogar > 94%.

11.2 Ergebnisse

Von den gereinigten Isoformen (IF) wurden folgende Daten erhoben:

- Relative Verteilung der N-gebundenen Kohlenhydratstrukturen (Anteil an bi-, tri- und tetraantennären Strukturen an der Gesamtglycosilierung) und des Repeatgehalts
- biologische Aktivität im Normo-Maus-Test
- Sialinsäuregehalt

Diese Bestimmungen wurden im wesentlichen nach den zuvor bereits beschriebenen Methoden durchgeführt.

Der Sialinsäuregehalt isolierter Isoformen wurde nicht für jede einzelne Isoformpräparation separat ermittelt, sondern wurde für jede der Isoformen 2-8 von EPO aus CHO-Zellen bzw. Isoformen 2-6 von EPO aus humanen Zellen beispielhaft an 1-3 Präparationen bestimmt.

Zur Berechnung des Produktes aus Gehalt an N-Acetyl-Lactosamineinheiten (LE-Wert) und dem Sialinsäuregehalt (SA) wurden die gerundeten, ganzzahligen Sialinsäurewerte jeder Isoform verwendet.

- 5 Diese gerundeten SA-Werte waren für EPO aus CHO-Zellen und humanen Zellen wie folgt: 14 (IF2), 13 (IF3), 12 (IF4), 11 (IF5), 10 (IF6), 9 (IF7) und 8 (IF8).

10 Die Tabelle 4 enthält Angaben zur Korrelation zwischen spezifischer Aktivität und Kohlenhydratstrukturen von verschiedenen EPO-Präparaten aus CHO-Zellen (CHO 1, CHO 2 und CHO 3) sowie aus humanen Zellen (HeLa 1 bis 5). Die Tabelle zeigt die Korrelation zwischen der biologischen Aktivität und der durchschnittlichen Gesamtzahl von N-Acetyl-Lactosaminheiten (LE) im EPO-Molekül, dem mittleren Sialinsäuregehalt (SA) sowie dem Produkt LE x SA.

15 Die Tabelle 5 enthält Angaben zur Korrelation zwischen der biologischen Aktivität und der durchschnittlichen Gesamtzahl von N-Acetyl-Lactosaminheiten (LE) im EPO-Molekül, dem mittleren Sialinsäuregehalt (SA) sowie dem Produkt LE x SA von isolierten Isoformen einer nicht vorfraktionierten EPO-Charge aus CHO-Zellen.

20 Die Tabelle 6 enthält einen Vergleich verschiedener Präparationen (A und B) einer Isoform (IF2 bzw. IF5), die aus unterschiedlichen Fraktionen einer vorfraktionierten EPO-Charge aus CHO-Zellen isoliert wurde, d.h. von der Isoform 2 bzw. 5 wurden je 2 Präparationen (A und B) analysiert. Die Vorfraktionierung erfolgte über einen DE-Anionenaustauscher, wie in Beispiel 11.1.C beschrieben. Die beiden Präparationen A und B der Isoform IF2 bzw. IF5 wurden aus unterschiedlichen Fraktionen der DE-Säule isoliert (IF2 aus den Fraktionen 5 und 6 und IF5 aus den Fraktionen 2 und 3). Die Fraktion

25

30

5 bzw. 2, aus der IF2/A bzw. IF5/A isoliert wurde, eluierte früher (bei geringerer Salzkonzentration) von der DE-Sepharose-Säule als die Fraktion 6 bzw. 3, aus der IF2/B bzw. IF5/B isoliert wurde. Die Präparationen A und B der Isoform 2 bzw. 5 unterscheiden sich aber nicht in ihrem Verhalten bei der anschließenden isoelektrischen Fokussierung oder in der Kapillarelektrophorese, d.h. beide Präparationen von IF2- bzw. IF5 haben den gleichen Sialinsäuregehalt. Überraschenderweise wurde jedoch festgestellt, daß die Isoformen aus der Präparation A aufgrund ihres höheren LE-Werts bzw. des höheren Anteils an Repeat-Strukturen eine signifikant höhere biologische Aktivität aufweisen als die entsprechenden Isoformen aus Präparation B. Die in Tabelle 6 beschriebene Abhängigkeit der biologischen Aktivität einer Isoform von der Gesamtzahl der im EPO-Molekül enthaltenen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bei gleichen Sialinsäuregehalt, wurde nicht nur für Isoform 2 und 5, sondern auch für andere Isoformen beobachtet.

15

Die Tabelle 7 vergleicht entsprechende Isoformen aus verschiedenen EPO-Quellen (CHO-Zellen oder humane HeLa S3-Zellen). Auch hier wird eine Korrelation der biologischen Aktivität mit dem LE x SA-Wert gefunden.

20 In allen Tabellen ist somit eine Korrelation des Produkts aus Anzahl der N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten (LE) mit dem Sialinsäuregehalt (SA) und der biologischen Aktivität zu erkennen. Ein hoher Wert des Produkts LE X SA ist stets mit einer hohen biologischen Aktivität assoziiert.

Tabelle 4:

Bezeichnung	tetra- ant. (in %)	repeat (in %)	LE	SA mol/- mol	LExSA	sp zif. Akt. KU/mg
CHO 1	86,7	39,6	12,9	12,9	166,4	248
CHO 2	78,6	51	13,2	11,8	155,8	225
CHO 3	73,5	42,6	12,6	11,7	147,4	186
HeLa 1	85,4	18,0	12,0	13,1	157,2	220
HeLa 2	82,2	16,5	11,9	13,2	157,1	198
HeLa 3	78,2	14,0	11,7	13,3	155,6	204
HeLa 4	70,6	12,2	11,25	11,6	130,5	176
HeLa 5	62	9,8	10,8	10,8	116,7	100

LE: N-Acetyl-Lactosamineinheiten

SA: Sialinsäuregehalt des EPO-Präparats

1: %-Anteil aller Zuckerstrukturen mit zusätzlichen LE-Verlängerungen
bezogen auf die Gesamtheit der Zuckerstrukturen
(bi + tri + tetra = 100%)

Tabelle 5

	tetra- ant. (in %)	repeat ¹ (in %)	LE	SA mol/mol	LExSA	spezif. Akt. KU/mg
IF2	98	48	13,7	14	191,1	400
IF3	86	43	13,1	13	170,3	280
IF4	75	40	12,6	12	151,2	200
IF5	64	39	12,0	11	132	150
IF6	56	41	11,4	10	114	75
IF7	42	39	11,1	9,0	100	40
IF8	34	33	10,5	8,0	84	19

LE: N-Acetyl-Lactosamineinheiten (berechnet wie in Beispiel 7)

SA: Sialinsäuregehalt der jeweiligen Isoform.

1 %-Anteil aller Zuckerstrukturen mit zusätzlichen LE-Verlängerungen
bezogen auf die Gesamtheit der Zuckerstrukturen
(bi + tri + tetra = 100%)

Tabelle 6

	tetra- ant. (in %)	repeat ¹ (in %)	LE	SA mol/mol	LExSA	spezif. Akt. KU/mg
IF2/A	99	54	14,1	14	197,4	396
IF2/B	97	31	12,9	14	180,6	330
IF5/A	64	58	13,2	11	145,2	206
IF5/B	55	32	11,4	11	125,4	112

LE: N-Acetyl-Lactosamineinheiten (berechnet wie im Beispiel 7 beschrieben)

SA: Sialinsäuregehalt der jeweiligen Isoform

¹ %-Anteil aller Zuckerstrukturen mit zusätzlichen LE-Verlängerungen bezogen auf die Gesamtheit der Zuckerstrukturen (bi + tri + tetra = 100%)

Tabelle 7

	tetra- ant. (in %)	repeat ¹ (in %)	LE	SA mol/mol	LexSA	spezif. Akt. KU/mg
IF2 (CHO 2)	99	58	14,4	14	201,6	440
IF2 (CHO 3)	98	48	13,7	14	191,8	400
IF2 (HeLaS3)	99	24	12,9	14	118,8	240
IF5 (CHO 2)	68	48	12,9	11	141,9	175
IF5 (CHO 3)	64	39	12,0	11	132,0	150
IF5 (HeLaS3)	70	15	10,8	11	119,0	60

LE: N-Acetyl-Lactosamineinheiten (berechnet wie in Beispiel 7 beschrieben)

SA: Sialinsäuregehalt der jeweiligen Isoform

¹ %-Anteil aller Zuckerstrukturen mit zusätzlichen LE-Verlängerungen bezogen auf die Gesamtheit der Zuckerstrukturen (bi + tri + tetra = 100%)

Figur 4 zeigt am Beispiel individueller Isoformen die Abhängigkeit der biologischen Aktivität von EPO vom Anteil an N-gebundenen Kohlenhydratstrukturen mit zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten (Repeats). Die Isoformen wurden aus EPO-Präparationen mit unterschiedlichem Anteil an Repeat-haltigen Kohlenhydratstrukturen isoliert (EPO 1 mit ca. 50%, EPO 2 mit ca. 40% und EPO 3 mit ca. 15% repeathaltiger Strukturen). Die biologische Aktivität entsprechender Isoformen (gleicher Gehalt an Sialinsäuren und etwa gleiche Antennarität) ist um so geringer, je niedriger der Anteil an Repeat-haltigen Kohlenhydratstrukturen in den Isoformen ist. Dieses Merkmal ist von Isoform 2 bis mindestens Isoform 7 zu beobachten.

Ansprüche

1. EPO-Zusammensetzung,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie im wesentlichen aus glykosilierten EPO-Molekülen besteht,
die einen Anteil von mindestens 75% tetraantennären Strukturen
bezogen auf die Gesamtzahl von N-gebundenen Kohlenhydratketten
enthalten.
2. EPO-Zusammensetzung,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie aus glykosylierten EPO-Molekülen besteht, die einen
mittleren Anteil von mindestens 75% tetraantennären Strukturen
bezogen auf die Gesamtzahl von N-gebundenen Kohlenhydratketten
enthalten.
3. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Anteil der tetraantennären Strukturen mindestens 80% ist.
4. EPO-Zusammensetzung,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie im wesentlichen aus glykosylierten EPO-Molekülen besteht,
die eine Anzahl von durchschnittlich mindestens 3,7 N-Acetyl-
Lactosamin-Einheiten bezogen auf eine N-gebundene
Kohlenhydratkette eines EPO-Moleküls bzw. von durchschnittlich
mindestens 11.1 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf die
Gesamt-N-Glycosilierung eines EPO-Moleküls enthalten.

5. EPO-Zusammensetzung,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie aus glykosylierten EPO-Molekülen besteht, die eine mittlere
Anzahl von durchschnittlich mindestens 3,7 N-Acetyl-Lactosamin-
Einheiten bezogen auf eine N-gebundene Kohlenhydratkette bzw.
von durchschnittlich mindestens 11,1 N-Acetyl-Lactosamin-
Einheiten bezogen auf die Gesamt-N-Glycosilierung eines EPO-
Moleküls enthalten.
6. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten mindestens 4,0
bezogen auf eine N-gebundene Kohlenhydratkette bzw. 12,0
bezogen auf die Gesamt-N-Glycosilierung ist.
7. EPO-Zusammensetzung,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie im wesentlichen aus glykosylierten EPO-Molekülen besteht,
die einen Wert für das Produkt aus der durchschnittlichen Anzahl
von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf eine N-gebundene
Kohlenhydratkette eines EPO-Moleküls multipliziert mit dem
mittleren Sialinsäuregehalt pro Molekül EPO von mindestens 43,3
bzw. mindestens 130 bezogen auf die Gesamt-N-Glycosilierung
eines EPO-Moleküls aufweisen.
8. EPO-Zusammensetzung,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie aus glykosylierten EPO-Molekülen besteht, die einen
mittleren Wert für das Produkt aus der durchschnittlichen Anzahl
von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf eine N-gebundene
Kohlenhydratkette eines EPO-Moleküls multipliziert mit dem
mittleren Sialinsäuregehalt pro Molekül EPO von mindestens 43,3

bzw. mindestens 130 bezogen auf die Gesamt-N-Glycosilierung eines EPO-Moleküls aufweisen.

- 5 9. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Wert des Produkts mindestens 46,7 bezogen auf eine N-gebundene Kohlenhydratkette bzw. mindestens 140 bezogen auf die Gesamt-N-Glycosilierung ist.
- 10 10. EPO-Zusammensetzung,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie die Merkmale von mindestens zwei der Ansprüche 1, 2, 4, 5, 7 und 8 aufweist.
- 15 11. EPO-Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie ein Gemisch aus 2 bis 5 Isoformen umfasst.
- 20 12. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie ein Gemisch aus 3 bis 4 Isoformen umfasst.
- 25 13. EPO-Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie eine spezifische Aktivität in vivo von mindestens 175 000 IU/mg Protein aufweist.
- 30 14. EPO-Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie eine spezifische Aktivität in vivo von mindestens 200 000 IU/mg Protein aufweist.

15. EPO-Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der mittlere Sialinsäuregehalt pro Molekül mindestens 11
beträgt.

5

16. EPO-Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die EPO-Moleküle das Produkt einer Expression exogener DNA
in Säugerzellen sind.

10

17. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
daß sie aus glykosilierten EPO-Molekülen aus CHO-Zellen besteht,
wobei der Anteil von Kohlenhydratketten mit N-Acetyl-Lactosamin-
Verlängerungen (Repeats) bezogen auf die Gesamtzahl von N-
gebundenen Kohlenhydratketten mindestens 30% ist.

15

18. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Wert für das Produkt aus dem Anteil von Kohlenhydratket-
ten mit N-Acetyl-Lactosamin-Repeats bezogen auf die Gesamtzahl
von Kohlenhydratketten und dem Anteil von tetraantennären
Strukturen bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten
mindestens 2400 ist.

20

25

19. EPO-Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
daß die EPO-Moleküle das Produkt einer Expression endogener DNA
in humanen Zellen sind.

30

20. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Anteil von Kohlenhydratketten mit N-Acetyl-Lactosamin-
Repeats bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten
mindestens 10% ist.
21. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Wert für das Produkt aus dem Anteil von Kohlenhydratkett-
ten mit N-Acetyl-Lactosamin-Repeats bezogen auf die Gesamtzahl
von Kohlenhydratketten und dem Anteil von tetraantennären
Strukturen bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten
mindestens 800 ist.
22. EPO-Zusammensetzung nach Anspruch 16 oder 19,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Kultivierung der Zellen in einem serumfreien Medium erfolgt
ist.
23. Pharmazeutisches Präparat,
dadurch gekennzeichnet,
daß es als Wirkstoff eine EPO-Zusammensetzung nach einem der
Ansprüche 1 bis 22 als Wirkstoff gegebenenfalls zusammen mit
üblichen pharmazeutischen Verdünnungs-, Hilfs- und Trägermitteln
enthält.
24. Verfahren zur Gewinnung einer EPO-Zusammensetzung,
insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 23,
dadurch gekennzeichnet,
daß man die EPO-Zusammensetzung mit den gewünschten Merkma-
len erhält durch mindestens eine der Maßnahmen:

- (a) Auswahl einer geeigneten Produktionszelle, welche in der Lage ist, Kohlenhydratketten mit einem hohen Anteil tetraantennärer Strukturen oder/und N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten zu erzeugen,
- 5 (b) Auswahl von geeigneten Kultivierungsbedingungen bei der Zellkultur, um Kohlenhydratketten mit einem hohen Anteil tetraantennärer Strukturen oder/und N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten zu erzeugen und
- 10 (c) Abtrennung unerwünschter Bestandteile aus einer bekannten Zusammensetzung von EPO-Molekülen unter Anreicherung von EPO-Molekülen, die Kohlenhydratketten mit einem hohen Anteil tetraantennärer Strukturen oder/und N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten enthalten.
- 15 25. Verfahren nach Anspruch 24,
dadurch gekennzeichnet,
daß Maßnahme (b) die Zugabe einer Mischung von mindestens 2 Kohlenhydraten und vorzugsweise mindestens 3 Kohlenhydraten zum Kulturmedium umfaßt.
- 20 26. Verfahren nach Anspruch 25,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine Glucose oder/und Mannose oder/und Galactose enthaltende Kohlenhydratmischung verwendet wird.
- 25 27. Verfahren nach Anspruch 24,
dadurch gekennzeichnet,
daß Maßnahme (b) die kontrollierte und bedarfsgerechte Zugabe von Nährstoffen, umfassend mindestens eine essentielle Aminosäure
30 oder/und mindestens ein Kohlenhydrat abhängig vom Bedarf der Zellen umfaßt.

28. Verfahren nach Anspruch 27,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Nährstoffbedarf der Zellen abhängig von der im
Kulturmedium gemessenen Konzentration an Glutamin ermittelt
wird.
29. Verfahren nach Anspruch 27 oder 28,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Nährstoffe bedarfsgerecht über die gesamte
Wachstumsphase der Zellen zugegeben werden.
30. Verfahren nach einem der Ansprüche 27 bis 29,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Nährstoffe eine Mischung von mindestens 2 Kohlenhydraten
und vorzugsweise mindestens 3 Kohlenhydraten umfassen.
31. Verfahren nach einem der Ansprüche 24 bis 30,
dadurch gekennzeichnet,
daß Maßnahme (b) die Kultivierung bei einer Temperatur zwischen
30 und 35,5°C, bevorzugt zwischen 33 und 35,0°C umfaßt.
32. Verfahren nach Anspruch 24,
dadurch gekennzeichnet,
daß Maßnahme (c) einen Reverse-Phase-Chromatographieschritt bei
einem pH-Wert im Bereich von 6-8 umfaßt.
33. Verfahren nach Anspruch 32,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein Acetonitril-, Ethanol- oder Isopropanol als Eluent verwendet
wird.

34. Verfahren nach Anspruch 24,
dadurch gekennzeichnet,
daß Maßnahme (c) einen Affinitätschromatographieschritt unter
Verwendung von Triazinfarbstoffen umfaßt.
35. Verfahren nach Anspruch 24,
dadurch gekennzeichnet,
daß Maßnahme (c) einen Affinitätschromatographieschritt unter
Verwendung von Lectinen umfaßt.
36. Verfahren zur Erhöhung der spezifischen Aktivität einer EPO-Zu-
sammensetzung,
dadurch gekennzeichnet,
daß man EPO-Moleküle in der Zusammensetzung anreichert, die
- (a) einen hohen Anteil an tetraantennären Kohlenhydratstruktu-
ren,
 - (b) eine große Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten,
 - (c) einen hohen Wert des Produkts aus der Anzahl von N-Acetyl-
Lactosamin-Einheiten und dem Sialinsäuregehalt,
 - (d) einen hohen Anteil an N-Acetyl-Lactosamin-Repeats oder/und
 - (e) einen hohen Wert des Produkts aus dem Anteil von N-Acetyl-
Lactosamin-Repeats und dem Anteil an tetraantennären
Kohlenhydratstrukturen aufweisen.
37. Verfahren nach Anspruch 36,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Anreicherung bis auf einen mittleren Anteil von mindestens
75% tetraantennären Strukturen bezogen auf die Gesamtzahl von
Kohlenhydratketten erfolgt.


38. Verfahren nach Anspruch 36,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Anreicherung bis auf eine mittlere Anzahl von mindestens
3,7 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf eine N-gebundene
Kohlenhydratkette eines EPO-Moleküls bzw. von durchschnittlich
mindestens 11,1 N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf die
Gesamt-N-Glycosylierung eines EPO-Moleküls erfolgt.
39. Verfahren nach Anspruch 36,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Anreicherung bis auf einen Wert des Produkts aus der
mittleren Anzahl von N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten bezogen auf
eine N-gebundene Kohlenhydratkette eines EPO-Moleküls
multipliziert mit dem mittleren Sialinsäuregehalt von mindestens
43,3 bzw. bezogen auf die Gesamt-N-Glycosylierung eines EPO-
Moleküls auf einen Wert von 130 erfolgt.
40. Verfahren nach Anspruch 36,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Anreicherung
(a) bei EPO aus CHO-Zellen, bis auf einen mittleren Anteil von
mindestens 30% N-Acetyl-Lactosamin-Repeats bezogen auf
die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten oder
(b) bei EPO aus humanen Zellen bis auf einen mittleren Anteil
von mindestens 10% N-Acetyl-Lactosamin-Repeats bezogen
auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten erfolgt.
41. Verfahren nach Anspruch 36,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Anreicherung
(a) bei EPO aus CHO-Zellen bis auf einen Wert des Produkts aus
dem mittleren Anteil von N-Acetyl-Lactosamin-Repeats


bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten multipliziert mit dem mittleren Anteil an tetraantennären Kohlenhydratstrukturen von mindestens 2400 oder

- (b) bei EPO aus humanen Zellen bis auf einen Wert des Produkts aus dem mittleren Anteil von N-Acetyl-Lactosamin-Repeats bezogen auf die Gesamtzahl von Kohlenhydratketten multipliziert mit dem mittleren Anteil an tetraantennären Kohlenhydratstrukturen von mindestens 800 erfolgt.


- 10 42. Verfahren nach einem der Ansprüche 36-41,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Anreicherung durch eine oder mehrere der Maßnahmen (a),
(b) und (c) gemäß Anspruch 24 erfolgt.

Figur 1: Tetraantennäre N-gebundene Kohlenhydratstruktur mit zusätzlichen N-Acetyl-Lactosamin-Einheiten (Repeats) und Sialinsäuren







Figur 2



Figur 3



Figur 4:



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 98/07876

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 C07K14/505 C12N15/16 C12N15/85 C12N5/06 C12N5/08
C12N5/10 A61K38/18

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 C12N C07K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	<p>TAKEUCHI M ET AL: "RELATIONSHIP BETWEEN SUGAR CHAIN STRUCTURE AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN PRODUCED IN CHINESE HAMSTER OVARY CELLS"</p> <p>PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA,</p> <p>vol. 86, October 1989, pages 7819-7822,</p> <p>XP002053701</p> <p>cited in the application</p> <p>see pages 7821-7822 and figure 3</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p style="text-align: center;">-/--</p>	<p>1-6,</p> <p>9-12,</p> <p>16-18,</p> <p>20,21,</p> <p>23,24,</p> <p>26,32,</p> <p>36,40-42</p>

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

14 May 1999

Date of mailing of the international search report

21/05/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Mateo Rosell, A.M.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 98/07876

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	<p>EP 0 754 703 A (KIRIN BREWERY) 22 January 1997</p> <p>see column 2, line 43 - column 3, line 15 see column 12, line 35-38 see column 7, line 15 - column 8, line 7 ---</p>	<p>1-6, 9-12, 16-18, 20,21, 23,24, 26,32, 36,40-42</p>
X	<p>WO 95 12684 A (AMGEN INC) 11 May 1995 see page 4, line 11 - page 5, line 28 ---</p>	<p>1,26-31</p>
A	<p>US 5 047 335 A (PAULSON JAMES ET AL) 10 September 1991</p> <p>see column 3, line 30 - column 4, line 43 ---</p>	<p>1,7,8, 11,12, 15,16,19</p>
A	<p>FUKUDA M N ET AL: "SURVIVAL OF RECOMBINANT ERYTHROPOIETIN IN THE CIRCULATION: THE ROLE OF CARBOHYDRATES" BLOOD, vol. 73, no. 1, January 1989, pages 84-89, XP000199651 cited in the application see the whole document and in particular page 88, column and figure 6 ---</p>	<p>1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40</p>
A	<p>WATSON E ET AL: "STRUCTURE DETERMINATION OF THE INTACT MAJOR SIALYLATED OLIGOSACCHARIDE CHAINS OF RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN EXPRESSED IN CHINESE HAMSTER OVARY CELLS" GLYCOBIOLOGY, vol. 4, no. 2, 1 January 1994, pages 227-237, XP000576965 see the abstract, table and discussion. ---</p>	<p>1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40</p>
A	<p>NIMTZ M ET AL: "STRUCTURES OF SIALYLATED OLIGOSACCHARIDES OF HUMAN ERYTHROPOIETIN EXPRESSED IN RECOMBINANT BHK-21 CELLS" EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, vol. 213, no. 1, 1 April 1993, pages 39-56, XP000576796 see pages 45-46, table 4 and discussion. ---</p>	<p>1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40</p>

-/--

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 98/07876

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	HOKKE C H ET AL: "STRUCTURAL ANALYSIS OF THE SIALYLATED N- AND O-LINKED CARBOHYDRATE CHAINS OF RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN EXPRESSED IN CHINESE HAMSTER OVARY CELLS. SIALYLATION PATTERNS AND BRANCH LOCATION OF DIMERIC N-ACETYLLACTOSAMINE UNITS" EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, vol. 228, March 1995, pages 981-1008, XP000199646 see figures and page 1002, discussion and table 5.	1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40
A	--- CHOI D ET AL: "Erythropoietin: physico- and biochemical analysis" JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B: BIOMEDICAL APPLICATIONS, vol. 687, no. 1, 6 December 1996, page 189-199 XP004062816 see the whole document and in particular pages 194-196 and figure 4.	1
A	--- EP 0 475 354 A (BEHRINGWERKE AG) 18 March 1992 see page 2-3	1,8,11, 12,15,16
A	--- WO 96 35718 A (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH ;BURG JOSEF (DE); SCHNEIDER WALTER (DE);) 14 November 1996 see the whole document	1,32-34
A	--- EP 0 267 678 A (INTEGRATED GENETICS, INC.) 18 May 1988 see the whole document and in particular page 5, lines 54-58. -----	1,22, 32-34

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 98/07876

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0754703	A	22-01-1997	AU 3815295 A US 5843713 A CN 1142229 A WO 9613516 A	23-05-1996 01-12-1998 05-02-1997 09-05-1996
WO 9512684	A	11-05-1995	AT 175999 T AU 8095494 A DE 69416166 D EP 0734450 A ES 2126793 T US 5459031 A	15-02-1999 23-05-1995 04-03-1999 02-10-1996 01-04-1999 17-10-1995
US 5047335	A	10-09-1991	NONE	
EP 0475354	A	18-03-1992	DE 4028800 A AU 661824 B AU 8376091 A CA 2051047 A JP 6105692 A PT 98917 A	12-03-1992 10-08-1995 19-03-1992 12-03-1992 19-04-1994 31-08-1992
WO 9635718	A	14-11-1996	AU 5817496 A CA 2220515 A EP 0830376 A JP 10506924 T	29-11-1996 14-11-1996 25-03-1998 07-07-1998
EP 267678	A	18-05-1988	US 4954437 A AU 7842987 A DK 478287 A FI 873897 A JP 63185396 A PT 85699 A,B	04-09-1990 16-03-1989 16-03-1988 16-03-1988 30-07-1988 01-10-1987

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6 C07K14/505 C12N15/16 C12N15/85 C12N5/06 C12N5/08
C12N5/10 A61K38/18

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 C12N C07K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	TAKEUCHI M ET AL: "RELATIONSHIP BETWEEN SUGAR CHAIN STRUCTURE AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN PRODUCED IN CHINESE HAMSTER OVARY CELLS" PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, Bd. 86, Oktober 1989, Seiten 7819-7822, XP002053701 in der Anmeldung erwähnt siehe Seiten 7821-7822 und Abbildung 3 --- -/--	1-6, 9-12, 16-18, 20,21, 23,24, 26,32, 36,40-42



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

14. Mai 1999

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

21/05/1999

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Mateo Rosell, A.M.

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 0 754 703 A (KIRIN BREWERY) 22. Januar 1997 siehe Spalte 2, Zeile 43 - Spalte 3, Zeile 15 siehe Spalte 12, Zeile 35-38 siehe Spalte 7, Zeile 15 - Spalte 8, Zeile 7 ---	1-6, 9-12, 16-18, 20,21, 23,24, 26,32, 36,40-42
X	WO 95 12684 A (AMGEN INC) 11. Mai 1995 siehe Seite 4, Zeile 11 - Seite 5, Zeile 28 ---	1,26-31
A	US 5 047 335 A (PAULSON JAMES ET AL) 10. September 1991 siehe Spalte 3, Zeile 30 - Spalte 4, Zeile 43 ---	1,7,8, 11,12, 15,16,19
A	FUKUDA M N ET AL: "SURVIVAL OF RECOMBINANT ERYTHROPOIETIN IN THE CIRCULATION: THE ROLE OF CARBOHYDRATES" BLOOD, Bd. 73, Nr. 1, Januar 1989, Seiten 84-89, XP000199651 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument und insbesondere Seite 88, linke Spalte und Fig. 6 ---	1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40
A	WATSON E ET AL: "STRUCTURE DETERMINATION OF THE INTACT MAJOR SIALYLATED OLIGOSACCHARIDE CHAINS OF RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN EXPRESSED IN CHINESE HAMSTER OVARY CELLS" GLYCOBIOLOGY, Bd. 4, Nr. 2, 1. Januar 1994, Seiten 227-237, XP000576965 siehe Zusammenfassung, Tabelle IV und discussion ---	1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40
A	NIMTZ M ET AL: "STRUCTURES OF SIALYLATED OLIGOSACCHARIDES OF HUMAN ERYTHROPOIETIN EXPRESSED IN RECOMBINANT BHK-21 CELLS" EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, Bd. 213, Nr. 1, 1. April 1993, Seiten 39-56, XP000576796 siehe Seiten 45-46, Tabelle 4 und discussion --- -/--	1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	HOKKE C H ET AL: "STRUCTURAL ANALYSIS OF THE SIALYLATED N- AND O-LINKED CARBOHYDRATE CHAINS OF RECOMBINANT HUMAN ERYTHROPOIETIN EXPRESSED IN CHINESE HAMSTER OVARY CELLS. SIALYLATION PATTERNS AND BRANCH LOCATION OF DIMERIC N-ACETYLLACTOSAMINE UNITS" EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, Bd. 228, März 1995, Seiten 981-1008, XP000199646 siehe Figs. aus Seite 1002, discussion und Tabelle 5	1,2,4,5, 16,17, 24, 36-38,40
A	CHOI D ET AL: "Erythropoietin: physico- and biochemical analysis" JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B: BIOMEDICAL APPLICATIONS, Bd. 687, Nr. 1, 6. Dezember 1996, Seite 189-199 XP004062816 siehe das ganze Dokument und insbesondere Seiten 194-196 und Fig. 4	1
A	EP 0 475 354 A (BEHRINGWERKE AG) 18. März 1992 siehe Seite 2-3	1,8,11, 12,15,16
A	WO 96 35718 A (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH ;BURG JOSEF (DE); SCHNEIDER WALTER (DE);) 14. November 1996 siehe das ganze Dokument	1,32-34
A	EP 0 267 678 A (INTEGRATED GENETICS, INC.) 18. Mai 1988 siehe das ganze Dokument and insbesondere Seite 5, Zeile 54-58.	1,22, 32-34

INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/07876

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0754703	A	22-01-1997	AU	3815295 A	23-05-1996
			US	5843713 A	01-12-1998
			CN	1142229 A	05-02-1997
			WO	9613516 A	09-05-1996
WO 9512684	A	11-05-1995	AT	175999 T	15-02-1999
			AU	8095494 A	23-05-1995
			DE	69416166 D	04-03-1999
			EP	0734450 A	02-10-1996
			ES	2126793 T	01-04-1999
			US	5459031 A	17-10-1995
US 5047335	A	10-09-1991	KEINE		
EP 0475354	A	18-03-1992	DE	4028800 A	12-03-1992
			AU	661824 B	10-08-1995
			AU	8376091 A	19-03-1992
			CA	2051047 A	12-03-1992
			JP	6105692 A	19-04-1994
			PT	98917 A	31-08-1992
WO 9635718	A	14-11-1996	AU	5817496 A	29-11-1996
			CA	2220515 A	14-11-1996
			EP	0830376 A	25-03-1998
			JP	10506924 T	07-07-1998
EP 267678	A	18-05-1988	US	4954437 A	04-09-1990
			AU	7842987 A	16-03-1989
			DK	478287 A	16-03-1988
			FI	873897 A	16-03-1988
			JP	63185396 A	30-07-1988
			PT	85699 A, B	01-10-1987